

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gel  
sodná sůl diklofenaku

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel  
30 g  
50 g  
60 g  
100 g  
120 g  
150 g  
200 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšimu použití.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Po otevření spotřebujte do 1 roku.

Datum otevření:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

29/229/17-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Diclofenac Dr.Max se u dospělých používá k úlevě od bolesti a ke zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. natažením, podvrtnutím a pohmožděním. U dospívajících od 14 let: ke krátkodobé místní léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postižené oblasti 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle velikosti léčené oblasti.

**Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

diclofenac dr.max 10 mg/g gel

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****tuba (30 g, 50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g and 200 g)****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Diclofenac Dr.Max 10 mg/g gel  
sodná sůl diklofenaku

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY**

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

gel  
30 g  
50 g  
60 g  
100 g  
120 g  
150 g  
200 g

**5. ZPŮSOB A CESTA**

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP  
Po otevření spotřebujte do 1 roku.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Max Pharma s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

29/229/17-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Diclofenac Dr.Max se u dospělých používá k úlevě od bolesti a ke zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. natažením, podvrtnutím a pohmožděním. U dospívajících od 14 let: ke krátkodobé místní léčbě bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postižené oblasti 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle velikosti léčené oblasti.

**Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.**

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**