

Příbalová informace: informace pro pacienta

Parapyrex 500 mg tablety paracetamol

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Parapyrex a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parapyrex užívat
3. Jak se přípravek Parapyrex užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Parapyrex uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Parapyrex a k čemu se používá

Paracetamol, léčivá látka přípravku Parapyrex, patří do skupiny léčiv, která zmírňují bolest a snižují horečku.

Parapyrex se používá k symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, zad, bolest při menstruaci, bolest svalů a kloubů při chřipce a/nebo k léčbě horečky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Parapyrex užívat

Neužívejte přípravek Parapyrex

- jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže trpíte závažným selháním jater, akutním zánětem jater (hepatitidou).
- jestliže máte závažnou hemolytickou anemii (abnormální rozpad červených krvinek).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Parapyrex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

- jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater (včetně Gilbertova syndromu nebo akutní hepatitidy, tj. zánětu jater);
- jestliže máte nedostatek enzymu nazývaného glukóza-6-fosfátdehydrogenáza;
- jestliže máte hemolytickou anemii (abnormální odbourávání červených krvinek);
- jestliže pravidelně požíváte velké množství alkoholu, nesmíte užívat více než 2 g paracetamolu (4x 500 mg tablety) denně;
- jestliže trpíte astmatem a jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID);
- jestliže jste dehydratovaný(á) nebo trpíte chronickou podvýživou.

Během léčby přípravkem Parapyrex okamžitě informujte svého lékaře:

Pokud trpíte závažnými onemocněními, zahrnujícími těžkou poruchu funkce ledvin nebo sepsi (stav, kdy bakterie a jejich toxiny kolují v krvi, což vede k poškození orgánů), nebo trpíte podvýživou, chronickým alkoholismem nebo pokud užíváte současně flukloxacilin (antibiotikum). U pacientů s těmito stavy, kdy se paracetamol užívá dlouhodobě v pravidelných dávkách nebo kdy se paracetamol užívá společně s flukloxacilinem, byl hlášen závažný stav zvaný metabolická acidóza (porucha krve a tělesných tekutin). Příznaky metabolické acidózy mohou zahrnovat: závažné dýchací obtíže s hlubokým rychlým dýcháním, ospalost, pocit na zvracení a zvracení.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí, pokud:

- máte závažnou infekci, protože ta může vést ke zvýšení rizika metabolické acidózy.

Příznaky metabolické acidózy jsou:

- hluboké, zrychlené a obtížné dýchání
- nevolnost (pocit na zvracení), zvracení
- ztráta chuti k jídlu

Pokud se u Vás objeví kombinace těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře.

Neužívejte Parapyrex v kombinaci s dalšími léčivými přípravky obsahujícími paracetamol.

Děti

Parapyrex není určen pro děti mladší než 6 let.

Další léčivé přípravky a Parapyrex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Některé léčivé přípravky mohou reagovat s paracetamolem.

Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete užívat paracetamol, pokud užíváte některý z následujících léků:

- barbituráty (používané k léčbě nespavosti a jako anestetika);
- některá antidepresiva;
- probenecid (k léčbě dny);
- chloramfenikol (antibiotikum);
- metoklopramid nebo domperidon (používaný k léčbě pocitu na zvracení a zvracení);
- kolestyramin (přípravek ke snížení hladiny cholesterolu);
- warfarin a další deriváty kumarinu (na ředění krve);
- zidovudin (lék používaný k léčbě AIDS);
- salicylamid nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) (léky proti bolesti);
- isoniazid (používaný k léčbě tuberkulózy);
- lamotrigin (k léčbě epilepsie);
- flukloxacilin (antibiotikum), z důvodu závažného rizika poruchy krve a tělních tekutin (zvané metabolická acidóza), která musí být urychleně léčena (viz bod 2).

Paracetamol může ovlivnit některé laboratorní testy (např. vyšetření krevního cukru, vyšetření moči).

Parapyrex s jídlem a pitím

Bud'te opatrní při užívání paracetamolu, jestliže pravidelně požíváte velké množství alkoholu.

V takovém případě nesmíte užívat více než 2 g paracetamolu (4x 500 mg tablety) denně. Během léčby se nesmí požívat alkohol.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Parapyrex lze užívat během těhotenství. Užívejte nejnižší možnou dávku, která snižuje bolest a/nebo horečku a užívejte ji po co nejkratší možnou dobu.

Porad'te se se sv'm l'ka'em, pokud bolest a/nebo hore'ka neustupuje nebo pokud byste pot'reboval(a) u'ivat p'ipravek 'ast'ji.

P'esto'ze paracetamol se v mal'ch m'no'stv'ch vylu'uje do mate'sk'ho ml'ka, nebyly pozorov'ny 'ad'n' ne'adou'c' 'u'inky na kojen' d'it'. Koj'c' ženy mohou paracetamol kr'atkodob' u'ivat v doporu'en' d'avce.

Ř'izen' dopravn'ch p'ost'edk' a obsluha stroj'

Tento p'ipravek neovlivnuje schopnost ř'edit dopravn' p'ost'edky a obsluhovat stroje.

Parapyrex obsahuje sod'k

Tento l'c'iv' p'ipravek obsahuje m'en' ne' 1 mmol (23 mg) sod'ku v jedn' tablet' , to znamen' , že je v podstat' „bez sod'ku“.

3. Jak se p'ipravek Parapyrex u'iv'

V'zdy u'ivate tento p'ipravek p'esn' podle pokyn' sv'ho l'ka'e nebo l'k'rn'ka. Pokud si nejste jist'('a), porad'te se se sv'm l'ka'em nebo l'k'rn'kem.

Doporu'en' d'avka p'ipravku je:

Pou'it' u dosp'el'ch a dosp'ivaj'c'ch od 15 let

1–2 tablety a' 4x denn' s 'asov'ym odstupem alespo' 4 hodiny.

1 tableta je vhodn' u osob s t'lesnou hmotnost' 34–60 kg, 2 tablety jsou vhodn' u osob s t'lesnou hmotnost' nad 60 kg.

Nejv'vyšší jednotliv' d'avka je 1 g (2 tablety), maxim'ln' denn' d'avka je 4 g (8 tablet).

Pou'it' u d'et' a dosp'ivaj'c'ch

12–15 let: 1 tableta 4–6x za 24 hodin. Maxim'ln' denn' d'avka je 3 g (6 tablet).

6–12 let: 250–500 mg paracetamolu (½ tablety a' 1 tableta). Jednotliv' d'avka ½ tablety je ur'ena pro d'et' s t'lesnou hmotnost' 21–32 kg, 1 tableta pro d'et' s t'lesnou hmotnost' od 33 kg. Jednotliv' d'avky pod'avejte v 'asov'ym odstupu nejm'en' 4–6 hodin. Maxim'ln' denn' d'avka p'ri t'lesn' hmotnosti 21–24 kg je 1,25 g (2 ½ tablety); maxim'ln' denn' d'avka p'ri t'lesn' hmotnosti 25–32 kg je 1,5 g (3 tablety); maxim'ln' denn' d'avka p'ri t'lesn' hmotnosti 33–40 kg je 2 g (4 tablety).

Tabletu zapijte velk'ym m'no'stv'm vody nebo v p'ipad' pot'reby rozpust'te tabletu ve sklenici vody a dob'e prom'ichejte p'ed vypit'.

Nepod'avejte d'et'm mlad's'ím ne' 6 let.

Neu'ivate p'ipravek 'ast'ji ne' jednou za 4 hodiny.

Neu'ivate spole'n' s dal's'imi l'ky obsahuj'c'imi paracetamol. Neu'ivate v'ce ne' maxim'ln' denn' doporu'enou d'avku.

Tabletu p'ipravku Parapyrex lze rozd'elit na dv' stejn' d'avky.

Jestli'ze bolest p'etrv'v' po 5 dnech l'c'by nebo jestli'ze hore'ka p'etrv'v' po 3 dnech l'c'by nebo se zhor's' 'i objev' j'n' p'znaky, mus'ite l'c'bu ukon'it a poradit se s l'ka'em.

Ú'inn' denn' d'avka 60 mg/kg/den (do maxim'ln' d'avky 2 g/den) nem' b'yt p'ekro'ena u n'asleduj'c'ch stav':

- dosp'el' s hmotnost' n'ížší ne' 50 kg
- m'rn' a' st'edn' t'ěžk' jatern' nedostate'nost, Gilbert'v syndrom (famili'rn' nehemolytick' 'loutenka)

- dehydratace
- chronická podvýživa

Pokud by se Vám zdál účinek paracetamolu velmi silný nebo slabý, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Parapyrex, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš velké množství paracetamolu, ihned se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka vzhledem k riziku opožděného závažného poškození jater.

Pokud jste užil(a) vyšší než uvedenou dávku, mohou se objevit příznaky jako pocit na zvracení, zvracení, pocení a ztráta chuti k jídlu. K bezvědomí ve většině případů nedochází. Přesto byste měli vyhledat okamžitou lékařskou pomoc.

V případě pozdní pomoci může být poškození jater nevratné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Parapyrex

Užijte vynechanou dávku co nejdříve. Pokud se však blíží čas pro další dávku, vynechanou dávku nenahrazujte a pokračujte v užívání dalších dávek v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout po užití paracetamolu:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

- Různé krevní abnormality, včetně agranulocytózy, trombocytopenie, neutropenie, trombocytopenické purpury, hemolytické anemie a leukopenie
- Alergické reakce (vyjma angioedému – otoku hlubokých vrstev kůže a podkoží nebo sliznic)
- Abnormální funkce jater, selhání jater, cirhóza (tvrdnutí jater), žloutenka
- Svědění (pruritus), vyrážka, pocení, purpura (tečkovité krvácení do kůže a sliznic) a kopřivka
- Předávkování a otrava
- Deprese, zmatenost, halucinace
- Třes, bolest hlavy
- Rozmazané vidění
- Edém (abnormální nahromadění tekutiny pod kůží)
- Krvácení, bolest břicha, průjem, pocit na zvracení, zvracení
- Závratě, horečka, ospalost

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

- Pancytopenie (snížení počtu krvinek)
- Hypersenzitivní reakce, pro které musí být léčba ukončena, včetně angioedému, obtížného dýchání, pocení, pocitu na zvracení, nízkého tlaku, šoku a anafylaxe (těžká alergická reakce)
- Křeče dýchacích svalů (bronchospasmus) u lidí, kteří jsou citliví na kyselinu acetylsalicylovou a jiné léky ze skupiny NSAID (skupina přípravků proti bolesti, zánětu a horečce)
- Jaterní otrava
- Kožní vyrážka
- Hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi)
- Tmavá moč (sterilní pyurie) a poruchy ledvin
- Závažné kožní reakce

Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit)

- Závažný stav, který může u pacientů s těžkým onemocněním, kteří užívají paracetamol, způsobit překyselení krve (zvané metabolická acidóza) (viz bod 2).

Rovněž po dlouhodobém užívání 3 až 4 gramů (6 až 8 tablet) paracetamolu denně může dojít k poškození jater. K poškození jater může také dojít při jednorázovém užití 6 gramů (12 tablet) paracetamolu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Parapyrex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Parapyrex obsahuje

- Léčivou látkou je paracetamol. Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.
- Pomocnými látkami jsou: povidon K30 (E 1201), předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) a kyselina stearová (E 570).

Jak Parapyrex vypadá a co obsahuje toto balení

Parapyrex 500 mg tablety jsou bílé tablety ve tvaru tobolek, na jedné straně označené „500“ a na druhé straně s půlicí rýhou. Tabletů lze rozdělit na stejné dávky. Tablety jsou zabaleny v PVC/Al blistrech.

Tento přípravek je dostupný v baleních obsahujících 50 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Výrobce:

Medis International a.s.
Výrobní závod Bolatice
Průmyslová 961/16
747 23 Bolatice
Česká republika

Qualimetrix S.A.
579 Mesogeion Avenue
Agia Paraskevi
15343 Atény
Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika	Parapyrex
Polsko	Panacit
Slovenská republika	Parapyrex

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 3. 2025.