

## **Příbalová informace: informace pro uživatele**

### **Tadalafil Stada 20 mg potahované tablety**

tadalafilum

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

#### **Co naleznete v této příbalové informaci**

1. Co je přípravek Tadalafil Stada a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Stada užívat
3. Jak se přípravek Tadalafil Stada užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Tadalafil Stada uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### **1. Co je přípravek Tadalafil Stada a k čemu se používá**

Přípravek Tadalafil Stada obsahuje léčivou látku tadalafil, která patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory fosfodiesterázy typu 5.

Přípravek Tadalafil Stada se užívá u dospělých mužů:

- **k léčbě erektilní dysfunkce.** Jedná se o poruchu, při které nedojde při sexuálním vzrušení ke ztopoření pohlavního údu nebo je toto ztopoření nedostatečné pro pohlavní styk. U tadalafilu se prokázalo, že významně zlepšuje schopnost dosáhnout ztopoření penisu nutné k sexuální aktivitě.

Přípravek Tadalafil Stada napomáhá při sexuálním dráždění uvolnit cévy penisu a umožnit tak dostatečný přívod krve do pohlavního údu. Výsledkem je zlepšené ztopoření penisu.

Netrpíte-li erektilní dysfunkcí, přípravek Tadalafil Stada pro Vás není určen. Je nutno poznamenat, že přípravek Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

#### **2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tadalafil Stada užívat**

##### **Neužívejte přípravek Tadalafil Stada**

- jestliže jste alergický na tadalafil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
- jestliže používáte organické nitráty v kterékoli formě nebo léky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit. Jedná se o skupinu léků používaných k léčbě anginy pectoris („bolesti na hrudi“). Bylo prokázáno, že tadalafil zesiluje účinky těchto léků. Používáte-li nitráty v jakékoli formě nebo si tím nejste jistý, obraťte se na svého lékaře
- pokud trpíte vážným srdečním onemocněním nebo jste během uplynulých 90 dnů prodělal srdeční infarkt

- pokud jste během uplynulých 6 měsíců prodělal mozkovou mrtvici
- pokud trpíte nízkým krevním tlakem nebo neléčeným vysokým krevním tlakem
- jestliže máte nebo pokud u Vás někdy došlo ke ztrátě zraku z důvodu neareritické přední ischemické neuropatie optického nervu (NAION), stav popisovaný jako „mrtvice oka“
- pokud užíváte riocigvát. Tento lék se používá k léčbě plicní arteriální hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích) a chronické tromboembolické plicní hypertenze (tedy vysokého krevního tlaku v plicích následkem krevních sraženin). U inhibitorů PDE5, jako je tadalafil, bylo prokázáno zvýšení hypotenzivních účinků tohoto léku. Pokud užíváte riocigvát, nebo si nejste jistý, řekněte to svému lékaři.

### **Upozornění a opatření**

Před užitím přípravku Tadalafil Stada se porad'te se svým lékařem.

Uvědomte si, že sexuální aktivita s sebou nese riziko pro pacienty se srdečním onemocněním vzhledem ke zvýšeným nárokům na činnost srdce. Pokud máte problémy se srdcem, řekněte to svému lékaři.

Než začnete užívat tablety, informujte svého lékaře, máte-li:

- srpkovitou anemii (porucha červených krvinek)
- mnohočetný myelom (nádorové onemocnění kostní dřeně)
- leukémii (nádorové onemocnění krve)
- jakoukoli deformaci pohlavního údu
- vážné onemocnění jater
- vážné onemocnění ledvin

Není známo, zda je přípravek Tadalafil Stada účinný u pacientů, kteří podstoupili:

- operaci v pánevní oblasti
- odstranění celé prostaty nebo odstranění části prostaty, při kterém byly přerušeny nervy prostaty (tzv. radikální nervy nešetřící prostatektomie).

Jestliže se u Vás objeví náhle vzniklá porucha vidění nebo ztráta zraku, nebo máte v průběhu užívání přípravku Tadalafil Stada zkreslené, zastřené vidění, přestaňte užívat Tadalafil Stada a ihned vyhledejte svého lékaře.

U některých pacientů užívajících tadalafil bylo zaznamenáno zhoršení sluchu nebo náhlá ztráta sluchu. I když není známo, zda je tato příhoda přímo spojena s tadalafil, v případě náhlého zhoršení nebo ztráty sluchu přestaňte přípravek Tadalafil Stada užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Přípravek Tadalafil Stada není určen pro ženy.

### **Děti a dospívající**

Přípravek Tadalafil Stada není určen pro děti a dospívající do 18 let.

### **Další léčivé přípravky a Tadalafil Stada**

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval, nebo které možná budete užívat.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada v případě, že používáte nitráty.

Některé léčivé přípravky mohou být ovlivněny přípravkem Tadalafil Stada, nebo mohou ovlivnit účinek přípravku Tadalafil Stada. Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

- alfa-blokátory (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, nebo k léčbě dolních močových cest u příznaků souvisejících s benigní hyperplazií prostaty)
- jiné přípravky určené k léčbě vysokého krevního tlaku
- riocigvát

- inhibitory 5-alfa reduktázy (používané k léčbě benigní hyperplazie prostaty)
- přípravky, jako je ketokonazol v tabletách (k léčbě plísňových onemocnění) a inhibitory proteázy k léčbě AIDS nebo infekce HIV
- fenobarbital, fenytoin a karbamazepin (protikřečové přípravky)
- rifampicin, erythromycin, klarithromycin nebo itraconazol
- jiné přípravky k léčbě erektilní dysfunkce.

### **Přípravek Tadalafil Stada s pitím a alkoholem**

Informace o účinku alkoholu jsou popsány v bodě 3. Grepový džus může ovlivnit, jak bude přípravek Tadalafil Stada účinkovat a měl by být užíván se zvýšenou opatrností. Další informace získáte u svého lékaře.

### **Plodnost**

Při zkoušení na zvířatech došlo k redukcí tvorby spermatu ve varlatech. Snížení počtu spermií bylo pozorováno také u některých mužů. Je nepravděpodobné, že by tyto účinky vedly ke snížení plodnosti.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Někteří muži užívající přípravek v klinických studiích hlásili výskyt závratí. Před řízením dopravních prostředků nebo obsluhou strojů poznejte svoji reakci na tablety.

### **Přípravek Tadalafil Stada obsahuje laktózu**

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat.

### **Přípravek Tadalafil Stada obsahuje sodík**

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

## **3. Jak se přípravek Tadalafil Stada užívá**

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

### Dávkování

Doporučená počáteční dávka je 10 mg tadalafilu před pohlavním stykem.

Nicméně Váš lékař rozhodl, že doporučená dávka 10 mg je pro Vás příliš slabá a má Vám být místo ní podána dávka o velikosti jedné 20mg tablety.

Tadalafil může být dostupný také ve formě 2,5mg, 5mg a 10mg tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Síla 2,5 mg a síla 10 mg není k dispozici od společnosti STADA Arzneimittel AG, ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci. Namísto jedné tablety o síle 10 mg lze užít dvě tablety o síle 5 mg od společnosti STADA Arzneimittel AG.

### Způsob podání

Tablety přípravku Tadalafil Stada jsou určeny pouze pro muže a užívají se perorálně (ústí). Tabletu polkněte celou s trochou vody. Tablety se mohou užívat s jídlem nebo bez jídla.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky: na pevném povrchu na tabletu jedním prstem zatlačte směrem dolů, aby se přelomila.

Přípravek Tadalafil Stada můžete užít nejpozději 30 minut před pohlavním stykem. Přípravek Tadalafil Stada může být stále účinný až po dobu 36 hodin po užití tablety.

Neužívejte přípravek Tadalafil Stada častěji než jednou denně. Dávky 10 mg a 20 mg jsou určeny k užití před předpokládanou sexuální aktivitou a nedoporučují se k trvalému každodennímu použití.

### Upozornění

Je nutno poznamenat, že přípravek Tadalafil Stada není účinný bez sexuálního dráždění. Milostná předehra bude mít proto stejný význam jako bez užívání léků na poruchu erekce.

Požití alkoholu může mít nepříznivý vliv na Vaši schopnost dosáhnout erekce a může způsobit přechodný pokles Vašeho krevního tlaku. Pokud jste užil, či plánujete užít přípravek Tadalafil Stada, vyvarujte se nadměrného požití alkoholu (tj. více než 900 ml piva nebo 350 ml vína), které může zvýšit riziko vzniku závratí při vstávání.

### **Jestliže jste užil více přípravku Tadalafil Stada, než jste měl**

Oznamte to svému lékaři. Mohou se u Vás vyskytnout nežádoucí účinky popsané v bodě 4.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto účinky jsou obvykle mírné nebo středně závažné.

### **Jestliže se u Vás vyskytne některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek užívat a ihned vyhledejte lékařskou pomoc:**

- alergická reakce včetně vyrážky (méně častá frekvence výskytu)
- bolest na hrudi – nepoužívejte nitráty, ale ihned vyhledejte lékařskou pomoc (méně častá frekvence výskytu)
- priapismus, tj. prodloužená a případně i bolestivá erekce po užití přípravku Tadalafil Stada (vzácná frekvence výskytu). V případě erekce přetrvávající déle než 4 hodiny vyhledejte urychleně lékaře.
- náhlá ztráta vidění (vzácná frekvence výskytu), zkreslené, zastřené, rozmazané centrální vidění nebo náhlé zhoršení vidění (frekvence není známa)

### **Další hlášené nežádoucí účinky:**

#### **Časté (pozorované až u 1 z 10 osob)**

- bolest hlavy
- bolest zad
- bolest svalů
- bolest rukou a nohou
- zarudnutí obličeje
- překrvení nosní sliznice
- trávicí potíže

#### **Méně časté (pozorované až u 1 ze 100 osob)**

- závratě
- bolest žaludku
- pocit na zvracení
- zvracení
- pálení žáhy
- rozmazané vidění
- bolest očí
- namáhavé dýchání
- přítomnost krve v moči
- prodloužená erekce
- bušení srdce
- rychlý srdeční tep

- vysoký krevní tlak
- nízký krevní tlak
- krvácení z nosu
- zvonění v uších
- otok rukou, nohou nebo kotníků
- pocit únavy

**Vzácné** (pozorované až u 1 z 1 000 osob)

- mdloby
- epileptické záchvaty
- přechodná ztráta paměti
- otoky víček
- zčervenání očí
- náhlé zhoršení nebo ztráta sluchu
- kopřivka (svědící červené skvrny na kůži)
- krvácení z penisu
- přítomnost krve v semenu
- zvýšené pocení

Vzácně byl u mužů užívajících tadalafil hlášen srdeční infarkt a mozková mrtvice. U většiny těchto mužů se vyskytly srdeční problémy již před užitím tohoto přípravku.

Vzácně bylo hlášeno částečné, dočasné nebo trvalé snížení nebo ztráta zraku na jednom nebo na obou očích.

**Některé další vzácné nežádoucí účinky** hlášené u mužů užívajících tadalafil nebyly pozorovány v klinických studiích. Tyto účinky jsou následující:

- migréna
- otok obličeje
- závažné alergické reakce způsobující otok obličeje nebo hrdla
- závažná kožní vyrážka
- některé poruchy ovlivňující prokrvení očí
- nepravidelný srdeční rytmus
- angina pectoris
- náhlé srdeční úmrtí
- zkreslené, zastřené, rozmazané centrální vidění nebo náhlé zhoršení vidění (frekvence není známa)

Závrať byla častěji hlášena u mužů starších 75 let užívajících tadalafil.

Průjem byl častěji hlášen u mužů starších 65 let užívajících tadalafil.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Tadalafil Stada uchovávat**

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Rozdělené tablety je třeba po 4 týdnech zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Tadalafil Stada obsahuje**

- Léčivou látkou je tadalafilum.  
Jedna potahovaná tableta obsahuje tadalafilum 20 mg.
- Pomocné látky:  
Jádro tablety  
Monohydrát laktózy  
Sodná sůl kroskarmelózy  
Natrium-lauryl-sulfát (E 487)  
Hyprolosa  
Polysorbát  
Mikrokrytalická celulóza  
Magnesium-stearát  
  
Potahová vrstva tablety  
Hypromelóza  
Monohydrát laktózy  
Oxid titaničitý (E 171)  
Triacetin  
Žlutý oxid železitý (E 172)  
Mastek

### **Jak přípravek Tadalafil Stada vypadá a co obsahuje toto balení**

Žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety o průměru  $10,1 \pm 0,2$  mm s dělicí rýhou ve tvaru kříže na obou stranách, v místě zlomu bílé. Tabletů lze rozdělit na stejné dávky.

Dodávají se v blistru obsahujícím 2x1, 4x1, 8x1, 12x1, 24x1, 36x1 nebo 48x1 potahovanou tabletu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

#### Držitel rozhodnutí o registraci

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

#### Výrobce

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2 – 18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

Centrafarm Services B.V.  
Van de Reijtstraat 31-E  
4814 NE Breda  
Nizozemsko

STADA M&D SRL  
Str. Trascăului, nr 10,  
RO-401135, Turda  
Rumunsko

**Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:**

Název členského státu	Název léčivého přípravku
Nizozemsko	Tadalafil CF 20 mg, filmomhulde tabletten
Česká republika	Tadalafil Stada
Německo	Tadalafil AL 20 mg Filmtabletten
Itálie	TADALAFIL EG STADA 20 mg compresse rivestite con film
Island	Tadalafil Stada 20 mg filmhúðaðar töflur
Portugalsko	Tadalafil Ciclum Farma

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 6. 2025**