

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ALMIRAL FORTE 20 mg/g gel
diklofenak-diethylamin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 23,2 mg diklofenak-diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol (E1520), isopropylalkohol, karbomer (C980), diethylamin, oleylalkohol, tekutý parafin (E905a), kokoyl-oktanodekanoát, cetostearamakrogol, butylhydroxytoluen (E321), čištěná voda, lavender care 57.
Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel

50 g [jen pro hliníkovou laminovanou tubu]
100 g
150 g [jen pro hliníkovou laminovanou tubu]

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 1 rok.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 29/602/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a dospívající od 14 let: Úleva od mírné až středně silné bolesti spojené s poraněním svalů a kloubů. Používejte po dobu maximálně 2 týdnů.

Gel aplikujte 2x denně (ráno a večer) na bolestivé místo. V závislosti na velikosti ošetřovaného místa použijte jako jednotlivou dávku množství gelu velikosti třešně až vlašského ořechu (odpovídá 2–4 g gelu).

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

almiral forte

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Tuba****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ALMIRAL FORTE 20 mg/g gel
diklofenak-diethylamin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 23,2 mg diklofenak-diethylaminu, což odpovídá 20 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol (E1520), isopropylalkohol, karbomer (C980), diethylamin, oleylalkohol, tekutý parafin (E905a), kokoyl-oktanodekanoát, cetostearamakrogol, butylhydroxytoluen (E321), čištěná voda, lavender care 57.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel

50 g [jen pro hliníkovou laminovanou tubu]
100 g
150 g [jen pro hliníkovou laminovanou tubu]

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 1 rok.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

MEDOCHEMIE Ltd., Limassol, Kypr

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 29/602/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dospělí a dospívající od 14 let: Úleva od mírné až středně silné bolesti spojené s poraněním svalů a kloubů. Použití po dobu maximálně 2 týdnů. Gel aplikujte 2x denně (ráno a večer) na bolestivé místo.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--