

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vicks SymptoMed Complete citrón 500 mg/200 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
Paracetamolum, guaifenesinum, phenylephrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje:

paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek dále obsahuje: sacharosu, sodík a aspartam (E951).

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

5 sáčků

10 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40

D-65824 Schwalbach am Taunus

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/592/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Vicks SymptoMed Complete citrón zmírňuje příznaky nachlazení a chřipky jako jsou bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti v krku, horečka, ucpaný nos a průduškový kašel.

Návod:

Rozpusťte obsah jednoho sáčku v hrnku horké, ale ne vroucí vody (asi ve 250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, při které lze nápoj vypít.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let věku:

1 sáček po 4-6 hodinách dle potřeby, maximálně až 4 sáčky během 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 12-ti let.

NEPŘEKRAČUJTE PŘEDEPSANOU DÁVKU.

OBSAHUJE PARACETAMOL. Neužívejte s jinými přípravky, které obsahují paracetamol. V případě předávkování okamžitě navštivte lékaře, i když se cítíte dobře.

Neužívejte současně s jinými léky proti chřipce, nachlazení nebo léky proti rýmě.

V těhotenství a při kojení se poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat. Rovněž tak při užívání jiných léků nebo jste-li v lékařské péči pro jiné onemocnění.

Přetrvávají-li příznaky déle než 3 dny, nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Vicks SymptoMed Complete citrón

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

SÁČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vicks SymptoMed Complete citrón 500 mg/200 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku
Paracetamolum, guaifenesinum, phenylephrini hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje:

paracetamolum 500 mg, guaifenesinum 200 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek dále obsahuje: sacharosu, sodík a aspartam (E951).

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

4,36 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Procter & Gamble GmbH

Sulzbacher Strasse 40

D-65824 Schwalbach am Taunus

Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/592/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Vicks SymptoMed Complete citrón zmírňuje příznaky nachlazení a chřipky jako jsou bolesti hlavy, bolesti svalů, bolesti v krku, horečka, ucpaný nos a průduškový kašel.

Návod:

Rozpusťte obsah jednoho sáčku v hrnku horké, ale ne vroucí vody (asi ve 250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, při které lze nápoj vypít.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 12 let věku:

1 sáček po 4-6 hodinách dle potřeby, maximálně až 4 sáčky během 24 hodin.

Nepodávejte dětem mladším 12 let.

NEPŘEKRAČUJTE PŘEDEPSANOU DÁVKU.

OBSAHUJE PARACETAMOL. Neužívejte s jinými přípravky, které obsahují paracetamol. V případě předávkování okamžitě navštivte lékaře, i když se cítíte dobře.

Neužívejte současně s jinými léky proti chřipce, nachlazení nebo léky proti rýmě.

V těhotenství a při kojení se poradte se svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat. Rovněž tak při užívání jiných léků nebo jste-li v lékařské péči pro jiné onemocnění.

Přetrvávají-li příznaky déle než 3 dny, nebo se zhoršují, navštivte lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--