

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Solmucol 100 mg granule pro perorální roztok v sáčku
acetylcysteinum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY LÁTEK

Léčivá látka: Jeden sáček obsahuje acetylcysteinum 100 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Granule pro perorální roztok v sáčku

20 sáčků

30 sáčků

40 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do: (měsíc/rok)

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

IBSA Slovakia s.r.o., Mýtna 42, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. číslo: 52/533/92-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Léčba akutních onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou hlenu jako je akutní zánět průdušek, hrtanu a průdušnice, chřipka a dráždivý kašel při nachlazení u dospělých, dospívajících a dětí od 6 měsíců.

Dávkování:

Dospělí a dospívající od 14 let: 3krát denně 2 sáčky Solmucolu 100 mg

Děti a dospívající mezi 6-14 lety: 3-4krát denně 1 sáček Solmucolu 100 mg

Děti mezi 2-6 lety: 2-3krát denně 1 sáček Solmucolu 100 mg

Děti od 6 měsíců do 2 let: 2-3krát denně ½ sáčku Solmucolu 100 mg

Dětem do 3 let podávat pouze na doporučení lékaře.

Obsah sáčku se rozmíchá a rozpustí v polovině sklenice vody.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Solmucol 100

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Sáček

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Solmucol 100 mg granule pro perorální roztok v sáčku
acetylcysteinum

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

3. POUŽITELNOST

Použitelné do:

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

1,5 g

6. JINÉ