

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

### KRABÍČKA A SÁČEK

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vicks SymptoMed Forte citrón 1000 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
Paracetamol, phenylephrini hydrochloridum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje:

Paracetamol 1000 mg

Phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg (odpovídající phenylephrinum 10 mg)

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek dále obsahuje pomocné látky se známým účinkem: sacharózu, aspartam (E 951), sodík.  
Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

5 g (*pouze na vnitřním obalu*)

5 sáčků

10 sáčků

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

#### 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

#### 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Procter & Gamble GmbH  
Sulzbacher Str. 40-50  
D-65824 Schwalbach am Taunus  
Německo

#### 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

07/603/10-C

#### 13. ČÍSLO ŠARŽE

LOT

#### 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

#### 15. NÁVOD K POUŽITÍ

Vicks SymptoMed Forte citrón přináší úlevu od projevů nachlazení a chřipky, včetně bolesti hlavy, horečky, svalové bolesti, ucpaného nosu, bolesti v krku.

##### **Návod k použití:**

Obsah 1 sáčku rozpustíte v hrnku s horkou, nikoliv vroucí vodou (přibližně 250 ml). Nechte zchladnout na teplotu, při které lze nápoj vypít.

##### **Dávkování:**

**Dospělí:** 1 sáček každých 4 - 6 hodin dle potřeby.

**Dospívající (starší 16 let):** 1 sáček každých 6 hodin dle potřeby.

Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin.

Nepodávejte dětem a mladistvým mladším 16 let.

**Užívejte přípravek jen, pokud je to nezbytně nutné.**

NEPŘEKRAČUJTE PŘEDEPSANOU DÁVKU.

OBSAHUJE PARACETAMOL. Neužívejte s jinými přípravky, které obsahují paracetamol.

Při předávkování ihned vyhledejte lékaře, i když se cítíte dobře.

V těhotenství a při kojení se porad'te svým lékařem dříve, než začnete tento lék užívat. Rovněž tak při užívání jiných léků, nebo jste-li v lékařské péči pro jiné onemocnění.

Pokud se příznaky onemocnění nezlepší do 3 dnů, obraťte se na svého lékaře. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 3 dny.

#### **16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

vicks symptomed forte citrón

#### **17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

#### **18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.