

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
KRABIČKA**

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepsils Med a Citron 0,6 mg/1,2 mg pastilky amylmetakresol/2,4 – dichlorbenzylalkohol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Složení:

Jedna pastilka obsahuje 0,6 mg amylmetakresolu, 1,2 mg 2,4 – dichlorbenzylalkoholu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: kyselina vinná, čištěný med, silice máty peprné a deterpenovaná citronová silice (silice obsahují citral, d-limonen, geraniol a linalol), chinolinová žlut', tekutá sacharosa, tekutá glukosa usušená rozprášením (z pšeničného škrobu).

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Pastilka

24 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN
MIMO DOHLED A**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Upozornění: Text na blistru je v bulharštině.

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH
PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Souběžný dovozce: RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 69/372/92-S/C/PI/056/21

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od bolesti v krku

Působí proti bakteriím, virům a kvasinkám

Strepsils Med a Citron se používá k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní, hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pastilky Strepsils Med a Citron jsou určeny pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let.

Dávkování:

Pastilku nechte volně rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny.

Dospělí: používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Přetrvávají-li u Vás příznaky onemocnění déle než 3 dny, vyhledejte lékaře.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

strepsils med a citron

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.