

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

**Krabička**

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TANTOGRIP citrón a med 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
paracetamol/fenylefrin-hydrochlorid

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden sáček obsahuje: 600 mg paracetamolu, 10 mg fenylefrin-hydrochloridu (což odpovídá 8,2 mg fenylefrinu)

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: sacharóza, sodík.

Další údaje – viz příbalová informace.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok v sáčku

10 sáčků

16 sáčků

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Neužívejte s dalšími léky na nachlazení a chřipku a s léky uvolňujícími zduření nosní sliznice.  
OBSAHUJE PARACETAMOL. Nepřekračujte uvedené dávkování. Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit závažné poškození jater.

Neužívejte žádné další přípravky obsahující paracetamol.

Neužívejte tento přípravek bez doporučení Vašeho lékaře, pokud máte onemocnění jater nebo problémy s konzumací alkoholu.

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

Neznečišťujte životní prostředí nepoužitými léčivy nebo jejich zbytky. Vyhod'te je do příslušných nádob určených k likvidaci léčiv.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Brno, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. číslo: 07/722/15-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

**Indikace**

Zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, včetně úlevy od mírné až středně silné bolesti, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a horečky.

Použijte tento lék, pouze pokud jsou příznaky chřipky a nachlazení doprovázeny ucpaným nosem.

**Dávkování**

*Dospělí a dospívající od 12 let a s hmotností více než 40 kg:* 1 sáček podle potřeby až 4krát denně.

Mezi jednotlivými dávkami dodržujte interval nejméně 4-6 hodin. Neužívejte více než 4 sáčky během 24 hodin.

Rozpusťte obsah sáčku ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a vypijte.

Neužívejte TANTOGRIP déle než 5 dní.

**16. INFORMACE V BRAILLOVÉ PÍSMU**

tantogrip citrón a med

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

Sáček

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

TANTOGRIP citrón a med 600 mg/10 mg prášek pro perorální roztok v sáčku  
paracetamol/fenylefrin-hydrochlorid

Perorální podání

### 2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Rozpusťte obsah sáčku ve sklenici (přibližně 150 ml) horké nebo studené vody a vypijte.

### 3. POUŽITELNOST

EXP

### 4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

### 5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

Jeden sáček (4,1 g) obsahuje léčivé látky: 600 mg paracetamolu, 10 mg fenylefrin-hydrochloridu.  
Přípravek také obsahuje: sacharózu a sodík (další údaje – viz příbalová informace).

### 6. JINÉ

**Indikace:** zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, včetně úlevy od mírné až středně silné bolesti, bolesti v krku a bolesti hlavy, zduření nosní sliznice a horečky.

TANTOGRIP je určen k podávání dospělým a dospívajícím od 12 let a s hmotností více než 40 kg.

**Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.**

**Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.**