

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Forte chřipka a kašel horký nápoj citron 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok
paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid

Pro dospělé a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden jednodávkový sáček obsahuje: 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg fenylefrin-hydrochloridu, 200 mg guaifenesinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje: sacharosu, sodík a aspartam (E 951).
Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok
10 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Haleon Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/199/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na co se používá Panadol Forte chřipka a kašel horký nápoj citron?

Panadol Forte chřipka a kašel horký nápoj citron se užívá krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, jako jsou mírná až středně silná bolest, horečka, ucpaný nos a vlhký, produktivní kašel.

Jak užívat Panadol Forte chřipka a kašel horký nápoj citron?

Dospělí, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg: 1 sáček každých 4 až 6 hodin podle potřeby. Celková denní dávka nemá překročit 3 sáčky/24 hodin. Doba léčby nemá překročit 3 dny.

Rozpusťte obsah jednoho sáčku v hrnku horké, ale ne vařící vody (250 ml). Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Ponechejte vychladnout na teplotu vhodnou k pití, ale vypijte ještě teplé.

Tento léčivý přípravek nemají užívat děti a dospívající do 16 let a dospívající ve věku 16 – 18 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Kontaktujte lékaře, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší.

Obsahuje paracetamol.

Neužívejte s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.

V případě předávkování je potřeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

Neužívejte s jinými přípravky na kašel, nachlazení nebo rýmu nebo s alkoholem.

Neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Poradte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat:

- pokud užíváte jiné léčivé přípravky;
- pokud jste v lékařské péči.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

panadol forte horký nápoj

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Sáček

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol Forte chřipka a kašel horký nápoj citron 1 000 mg/200 mg/12,2 mg prášek pro perorální roztok
paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid

Pro dospělé a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden jednodávkový sáček prášku obsahuje: 1000 mg paracetamolu, 12,2 mg fenylefrin-hydrochloridu, 200 mg guaifenesinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje: sacharosu, sodík a aspartam (E 951).

Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok

5,16 g

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Haleon Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/199/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Panadol se užívá krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, jako jsou mírná až středně silná bolest, horečka, ucpaný nos a vlhký, produktivní kašel.

Dospělí, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg: Jeden sáček každých 4 až 6 hodin podle potřeby. Celková denní dávka nemá překročit 3 sáčky/24 hodin. Doba léčby nemá překročit 3 dny.

Rozpusťte obsah jednoho sáčku v hrnku horké, ale ne vařící vody (250 ml). Míchejte, dokud se prášek nerozpustí. Ponechejte vychladnout na teplotu vhodnou k pití, ale vypijte ještě teplé.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Neužívejte s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.

V případě předávkování je potřeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

Neužívejte s jinými přípravky na kašel, nachlazení nebo rýmu nebo s alkoholem.

Neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Poradte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat:

- pokud užíváte jiné léčivé přípravky;
- pokud jste v lékařské péči.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--