

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Theraflu Forte s vitaminem C lesní ovoce 1 000 mg/10 mg/70 mg prášek pro perorální roztok
paracetamol, phenylephrini hydrochloridum, acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna dávka (1 sáček) obsahuje: paracetamol 1 000 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg ,
acidum ascorbicum 70 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje: sacharózu, sodík, oranžovou žlut' (E 110), azorubin (E 122) a aspartam (E 951).
Úplný seznam pomocných látek najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok

5 sáčků

10 sáčků

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT SKLADOVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje paracetamol. Neužívejte společně s jinými přípravky obsahujícími paracetamol, léky na úlevu od kašle a nachlazení, překrveného či ucpaného nosu nebo s alkoholem.

V případě předávkování je potřeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

Nepřekračujte doporučenou dávku. Vyšší dávky, než jsou doporučené, mohou způsobit vážné poškození jater.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Haleon Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/091/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

*Šedě zvýrazněný text v této části se **nevztahuje** na vícejazyčné obaly*

Theraflu Forte s vitaminem C lesní ovoce se používá k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, pokud je ucpaný nos spojen s horečkou a/nebo mírnou až středně silnou bolestí, jako je bolest v krku, bolest hlavy, svalů a dutin. Theraflu Forte s vitaminem C lesní ovoce je určen pouze k použití u dospělých a starších osob s tělesnou hmotností 50 kg a více.

Theraflu Forte s vitaminem C lesní ovoce se užívá pouze tehdy, pokud trpíte všemi následujícími příznaky: ucpaný nos s horečkou a/nebo mírnou až středně silnou bolestí.

Na předním a zadním štítku:

Theraflu Forte s vitaminem C lesní ovoce je třeba užívat pouze v případě, že trpíte všemi následujícími příznaky:

- překrvení nosu (ucpaný nos)
- horečka

- mírná až střední bolest (bolest v krku, bolest hlavy, svalů a dutin)}

Pro dospělé a starší osoby s tělesnou hmotností 50 kg a více: 1 sáček každých 4 až 6 hodin podle potřeby. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Obsah jednoho sáčku rozpustíte ve sklenici horké, nikoli však vroucí vody. Pijte po vychladnutí na přijatelnou teplotu.

Nepřekračujte uvedenou dávku. Nesmí se používat déle než 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají i po 3 dnech nebo jsou doprovázeny vysokou horečkou, vyrážkou nebo neustupující bolestí hlavy, informujte o tom svého lékaře.

Chut' lesního ovoce a mentolu

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Theraflu Forte s vitamínem C lesní ovoce

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

SÁČEK

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Theraflu Forte s vitamínem C lesní ovoce 1 000 mg/10 mg/70 mg prášek pro perorální roztok

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna dávka (1 sáček) obsahuje: paracetamol 1 000 mg, phenylephrini hydrochloridum 10 mg, acidum ascorbicum 70 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: sacharózu, sodík, oranžovou žlut' (E 110), azorubin (E 122) a aspartam (E 951).
Úplný seznam pomocných látek najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Prášek pro perorální roztok.

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje paracetamol. Neužívejte společně s jinými přípravky obsahujícími paracetamol, léky na úlevu od kašle a nachlazení, překrveného či ucpaného nosu nebo s alkoholem.

V případě předávkování je třeba vyhledat okamžitou lékařskou pomoc, a to i když se cítíte dobře.

Nepřekračujte uvedenou dávku. Vyšší dávky, než jsou doporučené, mohou způsobit vážné poškození jater.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je sáček poškozen.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:
Haleon Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

Logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

07/091/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Šedě zvýrazněný text v této části se nevztahuje na vícejazyčné balíčky

Theraflu Forte s vitamínem C lesní ovoce se používá k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, pokud je ucpaný nos spojen s horečkou a/nebo mírnou až středně silnou bolestí, jako je bolest v krku, bolest hlavy, svalů a dutin. Theraflu Forte s vitamínem C lesní ovoce je určen pouze k použití u dospělých a starších osob s tělesnou hmotností 50 kg a více.

Theraflu Forte s vitamínem C lesní ovoce se užívá pouze tehdy, pokud trpíte všemi následujícími příznaky: ucpaný nos s horečkou a/nebo mírnou až středně silnou bolestí.

Pro dospělé a starší osoby s tělesnou hmotností 50 kg a více: 1 sáček každých 4 až 6 hodin podle potřeby. Neužívejte více než 4 sáčky za 24 hodin. Obsah jednoho sáčku rozpustíte ve sklenici horké, nikoli však vroucí vody. Pijte po vychladnutí na přijatelnou teplotu.

Nepřekračujte uvedenou dávku. Nesmí se používat déle než 3 dny. Pokud příznaky přetrvávají i po 3 dnech nebo jsou doprovázeny vysokou horečkou, vyrážkou nebo neustupující bolestí hlavy, informujte o tom svého lékaře.