

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA (OTC status)****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Paracetamol Zentiva k.s. 500 mg tablety
paracetamol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Tableta.

12 tablet
16 tablet
20 tablet
24 tablet
30 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.
Obsahuje paracetamol. Neužívejte současně jiné léky obsahující paracetamol.
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte onemocněním jater.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/036/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

- Používá se ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, menstruační bolest, bolest svalů a kloubů při chřipce a nachlazení a/nebo při horečce.

Přibližný věk	Tělesná hmotnost	Jednotlivá dávka	Maximální denní dávka
6–8 let	21–24 kg	½ tablety (250 mg)	2 tablety (1 g)
9–10 let	25–33 kg	½ tablety (250 mg)	3 tablety (1,5 g)
10–12 let	34–41 kg	1 tableta (500 mg)	4 tablety (2 g)
12–15 let	42–49 kg	1 tableta (500 mg)	5 tablet (2,5 g)
> 15 let	50–60 kg	1 tableta (500 mg)	6 tablet (3 g)
	> 60 kg	1–2 tablety (500–1000 mg)	6 tablet (3 g)*

* Maximální denní dávku 8 tablet (4 g) mohou užívat pacienti s tělesnou hmotností nad 60 kg pouze po konzultaci s lékařem.

Jednotlivá dávka může být podle potřeby opakována v intervalu nejméně 4 – 6 hodin.

Není určeno pro děti mladší 6 let s tělesnou hmotností nižší než 21 kg.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Paracetamol Zentiva k.s. 500 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paracetamol Zentiva k.s. 500 mg tablety
paracetamol

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Zentiva logo

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
