

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen Geiser 50 mg/g gel

ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, 90% diisopropanolamin, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g

100 g

150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem a mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Geiser Pharma S.L.

Polígono Mutilva Calle E, 5 bajo, 31192 Mutilva, Navarra

Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 29/179/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní, krátkodobé léčbě občasné bolesti svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím, a bolesti dolní části zad.

Pro dospělé a dospívající (starší 12 let):

Naneste 4 až 10 cm gelu (odpovídá 50 - 125 mg ibuprofenu) na postiženou oblast a jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Opakujte podle potřeby, maximálně čtyřikrát denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Ibuprofen Geiser 50 mg/g

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen Geiser 50 mg/g gel

ibuprofenum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje ibuprofenum 50 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, 90% diisopropanolamin, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g

100 g

150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/Y PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem a mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 30 dnů. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Geiser Pharma S.L.
Polígono Mutilva Calle E, 5 bajo, 31192 Mutilva, Navarra
Španělsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

29/179/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K místní, krátkodobé léčbě bolesti svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím, a bolesti dolní části zad u dospělých a dospívajících starších 12 let.

Naneste 4 až 10 cm gelu (odpovídá 50 - 125 mg ibuprofenu) na postiženou oblast a jemně vmasírujte, dokud se nevstřebá. Opakujte podle potřeby, maximálně čtyřikrát denně.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--