

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Migralgin 250 mg/250 mg/50 mg tablety  
kyselina acetylsalicylová, paracetamol, kofein

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 250 mg kyseliny acetylsalicylové, 250 mg paracetamolu a 50 mg kofeinu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tableta

10 tablet  
12 tablet  
20 tablet  
24 tablet

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Neužívejte současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou. Neužívejte tento léčivý přípravek bez doporučení lékaře, pokud trpíte onemocněním jater nebo máte problémy s pitím alkoholu.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP


**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Reg. č.: 07/641/12-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Bolest hlavy při záchvatech migrény  
Tenzní bolesti hlavy


Pro akutní léčbu mírné až středně silné bolesti hlavy při záchvatech migrény s aurou nebo bez aury a k léčbě tenzní bolesti hlavy u dospělých a dospívajících od 12 let věku.

Obvyklá dávka přípravku Migralgin je 1–2 tablety užívaná až 3× denně, pokud je třeba, s odstupem alespoň 4 hodin. Nepřekračujte dávku 6 tablet během 24 hodin.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Migralgin

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

 Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

 Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**  
**Blistr**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Migralgin 250 mg/250 mg/50 mg tablety  
kyselina acetylsalicylová, paracetamol, kofein

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Logo SANOFI/ Opella Healthcare Czech s.r.o.

**3. POUŽITELNOST**

*EXP*

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**