

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

TRAVEL GUM 20 mg léčivá žvýkáci guma
dimenhydrinát

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna léčivá žvýkáci guma obsahuje 20 mg dimenhydrinátu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: aspartam, sacharóza, glukóza, sorbitol aj.
Upozornění pro diabetiky: mějte na zřeteli obsah cukru 0,416 g v jedné léčivé žvýkáci gumě.
Nepoužívejte tento přípravek, jestliže trpíte fenylketonurií.
Další údaje naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

10 léčivých žvýkacích gum

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

K perorálnímu podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). Během řízení se tento přípravek nemá používat.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Viatrix Healthcare Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart, Dublin 15
Dublin
Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

20/1129/93-B/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Při nevolnosti a zvracení při cestování.
Účinkuje již při žvýkání.

K léčbě kinetózy (nevolnost a zvracení při cestování silničními dopravními prostředky, vlakem, letadlem nebo lodí) u dospělých a dospívajících od 15 let.

Dávkování:

Pokud obvykle trpíte kinetózou, 15-30 minut před začátkem cesty žvýkejte přibližně 10 minut jednu léčivou žvýkací gumu a poté ji vyplivněte. Pokud se přesto u Vás později vyskytnou obtíže, použijte při prvních příznacích ještě jednu léčivou gumu. Další léčivou gumu můžete použít až po 6 hodinách.

Pokud se u Vás kinetóza vyskytne neočekávaně, použijte Travel Gum co nejdříve po výskytu prvních obtíží.

Můžete použít maximálně 6 léčivých žvýkacích gum denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

travel gum

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**Blistr****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

TRAVEL GUM 20 mg léčivá žvýkací guma
dimenhydrinát

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Viatis Healthcare Limited

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ