

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ribas 20 mg potahované tablety  
rivaroxaban

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna potahovaná tableta obsahuje 20 mg rivaroxabanu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje laktózu a sodík.  
Další informace najdete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Potahované tablety  
28 potahovaných tablet  
98 potahovaných tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.  
Ulica Danica 5  
48000 Koprivnica  
Chorvatsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 16/579/17-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot.

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ****16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ribas 20 mg

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

PC:  
SN:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRU****BLISTR****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Ribas 20 mg potahované tablety  
rivaroxaban

**NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Belupo logo

**POUŽITELNOST**

EXP

**ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**JINÉ**

## KARTA PACIENTA

[Ribas potahované tablety 10 mg / 15 mg / 20 mg]

### Karta pacienta

**Ribas 10 mg (zaškrťovací okénko pro zaškrtnutí předepsané dávky)**

**Ribas 15 mg (zaškrťovací okénko pro zaškrtnutí předepsané dávky)**

**Ribas 20 mg (zaškrťovací okénko pro zaškrtnutí předepsané dávky)**

- Tuto kartu noste neustále při sobě
- Kartu ukažte každému lékaři nebo zubnímu lékaři ještě před ošetřením

### BELUPO (logo)

### Podstupuji antikoagulační léčbu přípravkem Ribas (rivaroxaban)

Jméno:

Adresa:

Datum narození:

Hmotnost:

Jiné léky/onemocnění:

### V naléhavém případě prosím informujte:

Jméno lékaře:

Telefonní číslo lékaře:

Razítko lékaře:

### Rovněž informujte:

Jméno:

Telefonní číslo:

Příbuzenský vztah:

### Informace pro ošetřujícího lékaře:

Hodnoty INR by neměly být používány, neboť nejsou spolehlivým ukazatelem antikoagulační aktivity přípravku Ribas.

### Co musím vědět o přípravku Ribas?

- Přípravek Ribas ředí krev, čímž brání tvorbě nebezpečných krevních sraženin.
- Přípravek Ribas užívejte přesně podle pokynů Vašeho lékaře. Aby byla zajištěna optimální prevence tvorby krevních sraženin, **nikdy nevynechávejte žádnou dávku.**
- Bez předchozí konzultace s lékařem nikdy nepřestávejte užívat přípravek Ribas, neboť by mohlo dojít ke zvýšení rizika tvorby krevních sraženin.
- Než začnete užívat přípravek Ribas, informujte svého lékaře o všech jiných lécích, které užíváte, Které jste v nedávné době užíval(a), nebo které se chystáte užívat.
- Před každým chirurgickým nebo jiným invazivním zákrokem informujte lékaře o tom, že užíváte přípravek Ribas.

### **Kdy požádat svého lékaře o radu?**

Pokud užíváte přípravek snižující srážlivost krve, jako je Ribas, je důležité, abyste si byl(a) vědom(a) jeho možných nežádoucích účinků. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je krvácení. Jestliže víte, že Vám hrozí riziko krvácení, bez porady s lékařem nezačínáte přípravek Ribas užívat. Okamžitě informujte svého ošetřujícího lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky nebo známky krvácení, jako například:

- bolest
- otok nebo nepříjemný pocit
- bolest hlavy, závrať nebo slabost
- neobvyklé modřiny, krvácení z nosu, krvácení z dásní, rány, které dlouho krvácejí
- menstruační nebo vaginální krvácení, které je silnější než obvykle
- krev v moči, která může být růžově nebo hnědě zbarvená, červená nebo černá stolice
- vykašlávání krve nebo zvracení krve nebo zvratky, které vypadají jako kávová sedlina

### **Jak se přípravek Ribas užívá??**

- Aby byla zajištěna maximální ochrana, přípravek Ribas
  - 10 mg se může užívat s jídlem nebo bez jídla
  - 15 mg se musí užívat s jídlem
  - 20 mg se musí užívat s jídlem