

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok
oktenidin-dihydrochlorid/fenoxxyethanol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g kožního spreje, roztoku obsahuje: 1 mg oktenidin-dihydrochloridu, 20 mg fenoxxyethanolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok kokamidopropylbetainu 38% (kokamidopropylbetain, kyselina kokosová, glycerol, čištěná voda, chlorid sodný), natrium-glukonát, glycerol 85%, roztok hydroxidu sodného, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok

50 ml
250 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Během aplikace mechanickým rozprašovačem přípravek nevdechujte.

Vyvarujte se podání Octicidu do krevního oběhu např. v důsledku náhodného podání injekce.

Nepoužívejte Octicide v blízkosti kůže ošetřené antiseptiky na bázi jodovaného povidonu, protože v přilehlých oblastech může dojít k tmavě hnědému až fialovému zbarvení kůže.

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte Octicide do 12 měsíců, avšak s ohledem na dodržení doby použitelnosti.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.

Pražská 442

281 67 Stříbrná Skalice

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

32/077/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K opakovanému krátkodobému antiseptickému ošetření povrchových ran. Octicide se používá v neředěné formě, bezprostředně po poranění nebo při prvních známkách zánětu.

Aplikujte Octicide jednou denně opakovaným stisknutím mechanického rozprašovače na ošetřovanou oblast, dokud není celá ošetřovaná oblast úplně zvlhčena. Nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dní.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Octicide

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA/HDPE lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Octicide 1 mg/g + 20 mg/g kožní sprej, roztok
oktenidin-dihydrochlorid/fenoxyethanol

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g kožního spreje, roztoku obsahuje: 1 mg oktenidin-dihydrochloridu, 20 mg fenoxyethanolu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Roztok kokamidopropylbetainu 38% (kokamidopropylbetain, kyselina kokosová, glycerol, čištěná voda, chlorid sodný), natrium-glukonát, glycerol 85%, roztok hydroxidu sodného, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní sprej, roztok
50 ml
250 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Během aplikace mechanickým rozprašovačem přípravek nevdechujte.

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte Octicide do 12 měsíců, avšak s ohledem na dodržení doby použitelnosti.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ENEO Pharmaceuticals s. r. o.
Pražská 442
281 67 Stříbrná Skalice
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

32/077/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K opakovanému krátkodobému antiseptickému ošetření povrchových ran.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM