

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pelafen sirup

suchý extrakt z kořene pelargonie

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml sirupu obsahuje 8 g extraktu (ve formě suchého extraktu) (4-25:1) z *Pelargonium sidoides* DC a/nebo *Pelargonium reniforme* Curt, radix (pelargoniový kořen).
Extrakční rozpouštědlo: ethanol 11 % m/m.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje roztok maltitolu (E 965) a sorbitol (E 420). Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup
100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze pro perorální podání.

Před použitím lahvičku protřepejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření má být sirup spotřebován do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte v uzavřené lahvičce při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/437/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pelafen je tradiční rostlinný léčivý přípravek k léčbě příznaků nachlazení u dospělých, dospívajících a dětí od 6 let.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku v uvedené indikaci je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Dospívající od 12 let, dospělí a starší osoby:

2,5 ml sirupu třikrát denně

Děti od 6 do 11 let:

2,5 ml sirupu dvakrát denně

Nedoporučuje se používat u dětí mladších 6 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pokud příznaky přetrvávají během užívání přípravku nebo pokud se objeví nežádoucí účinek, je třeba se poradit s lékařem.

K léčbě příznaků nachlazení.
Pro děti od 6 let a dospělé.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

pelafen sirup

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Štítek na lahvičku

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Pelafen sirup

suchý extrakt z kořene pelargonie

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml sirupu obsahuje 8 g extraktu (ve formě suchého extraktu) (4-25:1) z *Pelargonium sidoides* DC a/nebo *Pelargonium reniforme* Curt, radix (pelargoniový kořen).

Extrakční rozpouštědlo: ethanol 11 % m/m.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje maltitol (E 965) a sorbitol (E 420).

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Sirup
100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Pouze pro perorální podání.

Před použitím lahvičku protřepejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření má být sirup spotřebován do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte v uzavřené lahvičce při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Phytopharm Klęka S.A.
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 94/437/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Dospívající od 12 let, dospělí a starší osoby:
2,5 ml sirupu třikrát denně

Děti od 6 do 11 let:
2,5 ml sirupu dvakrát denně

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU