

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACYLPYRIN s vitamínem C 320 mg/200 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum/acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: laktózu, draslík a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

12 šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Po použití tubu ihned uzavřete.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., generála Svobody 335, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 07/319/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce a nachlazení.

K potlačení mírné až střední bolesti – hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci.

Obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

acylpyrin s vit. c

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

PP tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ACYLPYRIN s vitamínem C 320 mg/200 mg šumivé tablety

acidum acetylsalicylicum/acidum ascorbicum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 320 mg a acidum ascorbicum 200 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje: laktózu, draslík a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

12 šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Popoužití tubu ihned uzařete.

8. POUŽITELNOST

EXP: číselný údaj je natištěný na spodní části tuby

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Č. reg.: 07/319/98-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže: číselný údaj je natištěný na spodní části tuby

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících je 1 tableta každé 4 hodiny, nejvýše 6 tablet za den.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM