

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Streptfen Med a Eukalyptus bez cukru 8,75 mg pastilky

flurbiprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna pastilka obsahuje 8,75 mg flurbiprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje isomalt (E 953), roztok maltitolu (E 965), makrogol 300, hydroxid draselný (E 525), amoniakový karamel (E 150c), kurkumin (E 100) (obsahuje propylenglykol (E 1520) a Polysorbát 80), aroma manukového medu a eukalyptu (obsahuje směs umělých a/nebo přírodních aromatických látek a vhodných pomocných látek, triacetin (E 1518), propylenglykol (E 1520), 4-methoxybenzylalkohol, benzylalkohol, benzyl-benzoát, benzylcinnamát, benzyl-salicylát, cinnamal, cinnamylalkohol, citral, geraniol, limonen a linalol), draselnou sůl acesulfamu (E 950).

Další informace najdete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

8 pastilek
16 pastilek
24 pastilek
32 pastilek
36 pastilek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Orální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 69/009/19-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pastilky **Streptfen Med a Eukalyptus bez cukru** se používají ke krátkodobému zmírnění příznaků bolesti v krku, jako je bolest v hrdle, podráždění, otok a potíže s polykáním.

Pro dospělé a dospívající od 12 let.

Dávkování:

Jedna pastilka se nechá rozpustit v ústech každých 3 - 6 hodin podle potřeby. Při rozpouštění přemísťujte pastilku v ústech. Nepoužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin. Nepoužívejte přípravek déle než 3 dny.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Streptfen Med a Eukalyptus bez cukru 8,75 mg pastilky

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Strepfen Med a Eukalyptus bez cukru 8,75 mg pastilky

flurbiprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
