

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém
tribenosid/lidokain-hydrochlorid

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g rektálního krému obsahuje 50 mg tribenosidu a 20 mg lidokain-hydrochloridu (ve formě monohydrátu lidokain-hydrochloridu). 30 g rektálního krému obsahuje 1500 mg tribenosidu a 600 mg lidokain-hydrochloridu (ve formě monohydrátu lidokain-hydrochloridu)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Cetylalkohol, kyselina stearová, tekutý parafin, sorbitan-stearát, isopropyl-palmitát, methylparaben, propylparaben, nekystalizující sorbitol 70%, cetomakrogol 1000, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Rektální krém
30 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BYT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., generála Svobody 335, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

23/344/71-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K lokální léčbě vnějších a vnitřních hemoroidů.

Dospělí a dospívající od 15 let: 1-2x denně naneste krém na kůži v okolí konečníku.

Při léčbě vnitřních hemoroidů aplikujte rektální krém po vyprázdnění střeva 2krát denně pomocí aplikátoru nasazeného na tubu. Návod k použití aplikátoru naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

procto-glyvenol, krém

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Hliníková tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PROCTO-GLYVENOL 50 mg/g + 20 mg/g rektální krém
tribenosid/lidokain-hydrochlorid

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g rektálního krému obsahuje 50 mg tribenosidu a 20 mg lidokain-hydrochloridu (ve formě monohydrátu lidokain-hydrochloridu). 30 g rektálního krému obsahuje 1500 mg tribenosidu a 600 mg lidokain-hydrochloridu (ve formě monohydrátu lidokain-hydrochloridu)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Cetylalkohol, kyselina stearová, tekutý parafin, sorbitan-stearát, isopropyl-palmitát, methylparaben, propylparaben, nekystalizující sorbitol 70%, cetomakrogol 1000, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Rektální krém
30 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHDONÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Herbacos Recordati s.r.o., generála Svobody 335, Rosice, 533 51 Pardubice, Česká republika.

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

23/344/71-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K lokální léčbě vnějších a vnitřních hemoroidů.

Dospělí a dospívající od 15 let: 1-2x denně naneste krém na kůži v okolí konečníku.

Při léčbě vnitřních hemoroidů aplikujte rektální krém po vyprázdnění střeva 2krát denně pomocí aplikátoru nasazeného na tubu. Návod k použití aplikátoru naleznete v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM