

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Minoxidil mioWell 20 mg/ml kožní roztok
minoxidil

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden mililitr kožního roztoku obsahuje 20 mg minoxidilu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, ethanol a čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Kožní roztok.

1 x 100 ml roztoku
3 x 100 ml roztoku

S aplikátorem pro aplikaci na malé plochy.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Nepožívejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nevdechujte.
Pouze k zevnímu použití.

8. POUŽITELNOST

EXP
Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.
Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

mioWell s.r.o.
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava
Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/441/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**PRO ŽENY**

K léčbě androgenního vypadávání vlasů u žen.
Stabilizuje průběh androgenní alopecie.
Podporuje růst vlasů.

Dávkování:

K místní aplikaci na suchou pokožku hlavy.
Aplikujte 1 ml roztoku dvakrát denně (ráno a večer) na postižené oblasti pokožky hlavy. Pro dávku 1 ml je zapotřebí 6 stříků.
Balení obsahuje 2 různá aplikační zařízení:
- rozprašovač pro velkoplošnou aplikaci
- samostatný aplikátor s prodlouženou špičkou pro aplikaci na malé plochy

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci a dodržujte návod k použití.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Minoxidil miowell 20 mg/ml

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

lahvička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Minoxidil mioWell 20 mg/ml kožní roztok
minoxidil

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden mililitr kožního roztoku obsahuje 20 mg minoxidilu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: propylenglykol, ethanol, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Lahvička 100 ml.

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.
Nepožívejte.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Nevdechujte.
Pouze k zevnímu použití.

8. POUŽITELNOST

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření: 12 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce.
Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

mioWell s.r.o.
Záhradnícka 95
821 08 Bratislava
Slovenská republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

46/441/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

PRO ŽENY

K léčbě androgenního vypadávání vlasů u žen.
Stabilizuje průběh androgenní alopecie.
Podporuje růst vlasů.

Dávkování:

K místní aplikaci na suchou pokožku hlavy.
Aplikujte 1 ml roztoku dvakrát denně (ráno a večer) na postižené oblasti pokožky hlavy. Pro dávku 1 ml je zapotřebí 6 stříků.
Balení obsahuje 2 různá aplikační zařízení:
- rozprašovač pro velkoplošnou aplikaci
- samostatný aplikátor s prodlouženou špičkou pro aplikaci na malé plochy

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
