

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PAPÍROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sanorin Combi 0,25 mg/ml + 5 mg/ml nosní kapky, roztok
naphazolini nitras + antazolini mesilas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Naphazolini nitras 2,5 mg, antazolini mesilas 50 mg v 10 ml

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky:

Kyselina boritá (E284), dihydrát dinatrium-edetátu, methylparaben (E218), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní kapky, roztok

10 ml

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po otevření spotřebujte do 3 měsíců a uchovávejte při teplotě do 25°C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Farmak International Sp. z o. o., ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa, Polsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 69/583/69-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K mírnění příznaků senné rýmy a vazomotorické alergické rýmy.

Dávkování:

Dospělí si kapou 2-3 kapky do každé nosní dírky několikrát denně. Dětem od 3 let se podávají 1-2 kapky do každé nosní dírky 3-4krát denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

sanorin combi

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU

ETIKETA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Sanorin Combi 0,25 mg/ml + 5 mg/ml nosní kapky, roztok

Naphazolini nitras 2,5 mg, antazolini mesilas 50 mg v 10 ml

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Nosní podání

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

10 ml

6. JINÉ

Logo Farmak