

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA – 50 g****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 3 měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLO

Reg. č.: 29/010/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Léčivý přípravek je zařazen mezi vyhrazená léčiva.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Místní úleva od občasné bolesti svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalu, lehkým podvrtnutím a úleva od bolesti dolní části zad.

Pro dospělé a dospívající (od 12 let):

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

Po každé aplikaci si umyjte ruce, pokud se však nejedná o ošetřované místo.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ibuprofen dr.max 50 mg/g

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**KRABÍČKA – 100 g a 150 g****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

100 g

150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 3 měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Dr. Max Pharma s.r.o.
Na Florenci 2116/15
Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/010/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Místní úleva od občasných bolestí svalů způsobené drobnými pohmožděninami, tupým poraněním nebo natažením svalů, ztuhlostí šíje nebo jiným stažením svalů, lehkým podvrtnutím a úleva od bolesti dolní části zad.

Pro dospělé a dospívající (od 12 let):

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

Po každé aplikaci si umyjte ruce, pokud se však nejedná o ošetřované místo.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

ibuprofen dr.max 50 mg/g

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Dr. Max 50 mg/g gel

ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram obsahuje 50 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: levomenthol, karbomerový kopolymer typ A, diisopropanolamin 90%, isopropylalkohol, glycerol (E 422), čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g

100 g

150 g

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Před prvním otevřením: Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 3 měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/010/18-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Úleva od bolesti svalů způsobené pohmožděním, tupým poraněním nebo natažením, ztuhlostí šíje, podvrtnutím a od bolesti dolní části zad u dospělých a dospívajících od 12 let.

Naneste 4 až 10 cm gelu na postiženou oblast a jemně masírujte, dokud se nevstřebá. Podle potřeby opakujte, maximálně 4x denně.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--