

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Flebazol 500 mg potahované tablety

mikronizovaný diosmin

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg mikronizovaného diosminu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahovaná tableta

15 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

|  |
|--|
| <b>10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ</b> |
|--|

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

|  |
|--|
| <b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b> |
|--|

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b> |
|------------------------------------|

Reg. č.: 85/868/15-C

|                        |
|------------------------|
| <b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b> |
|------------------------|

Lot

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b> |
|----------------------------------|

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

|                            |
|----------------------------|
| <b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b> |
|----------------------------|

**Bolest nohou**  
**Pocit tíhy v nohou**  
**Hemoroidy**

Přípravek Flebazol je indikován u dospělých k léčbě příznaků chronického žilního onemocnění (bolest nohou, pocit tíhy v nohou, noční křeče, otok nohou) a k léčbě příznaků spojených s akutním hemoroidálním onemocněním (bolest, krvácení a otok v oblasti konečníku).

**Dávkování:**

Chronické žilní onemocnění: 2 tablety denně, užívané v jedné dávce nebo ve dvou dílčích dávkách.  
Akutní hemoroidální onemocnění: 6 tablet denně během prvních 4 dnů léčby (tj. 3 tablety dvakrát denně); 4 tablety denně během následujících 3 dnů (tj. 2 tablety dvakrát denně). Následně pokračujte udržovací dávkou 2 tablety denně (tj. 1 tableta dvakrát denně). Bez porady s lékařem lze přípravek užívat 15 dní.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

|  |
|--|
| <b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b> |
|--|

flebazol 500 mg

|  |
|--|
| <b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b> |
|--|

Neuplatňuje se.

|  |
|--|
| <b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b> |
|--|

Neuplatňuje se.

|   |
|---|
| <b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b> |
|---|

|               |
|---------------|
| <b>Blistr</b> |
|---------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b> |
|------------------------------------|

Flebazol 500 mg potahované tablety

mikronizovaný diosmin

|  |
|--|
| <b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b> |
|--|

KRKA

|                        |
|------------------------|
| <b>3. POUŽITELNOST</b> |
|------------------------|

EXP

|                       |
|-----------------------|
| <b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b> |
|-----------------------|

Lot

|                |
|----------------|
| <b>5. JINÉ</b> |
|----------------|