

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diflaves 500 mg potahované tablety

mikronizované flavonoidy, obsahující 90 % diosminu a 10 % ostatních flavonoidů (vyjádřených jako hesperidin)

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 500 mg mikronizovaných flavonoidů, obsahujících 90 % diosminu (450 mg) a 10 % ostatních flavonoidů (vyjádřených jako hesperidin) (50 mg).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pro další informaci si přečtěte příbalovou informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

30 potahovaných tablet

60 potahovaných tablet

120 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Viatriis Limited
Damastown Industrial Park
Mulhuddart, Dublin 15
Dublin, Irsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

85/182/23-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

[Pro OTC]:

Diflaves je indikován u dospělých k léčbě známek a příznaků chronického žilního onemocnění dolních končetin, jako jsou bolest, pocit těžkých nohou, noční křeče, otoky, a k léčbě příznaků spojených s akutní hemoroidální atakou, jako jsou bolest, krvácení a otoky v oblasti konečníku.

Doporučená dávka pro chronické žilní onemocnění jsou 2 tablety denně. Léčivý přípravek musíte užívat alespoň 4 až 5 týdnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, poraďte se s lékařem. Pokud se příznaky zlepší, léčba může pokračovat až 2 měsíce.

Doporučená dávka pro akutní hemoroidální ataku je první 4 dny léčby 6 tablet. V následujících 3 dnech doporučená denní dávka činí 4 tablety. Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají po 7 dnech léčby, poraďte se s lékařem.

Podávání dětem a mladistvým mladším 18 let se nedoporučuje.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

diflaves 500 mg potahované tablety

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diflaves 500 mg potahované tablety

mikronizované flavonoidy, obsahující 90 % diosminu a 10 % ostatních flavonoidů (vyjádřených jako hesperidin)

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Viatis Limited, Irsko

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
