

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním
ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 400 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tablety s řízeným uvolňováním

12 tablet s řízeným uvolňováním

14 tablet s řízeným uvolňováním

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 07/006/24-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

K úlevě od bolesti a horečky

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy (včetně migrény), bolest zad, bolest zubů, dysmenorea, bolest svalů a kloubů, bolest po operaci, bolest a horečka při nachlazení a chřipce.

Dospělí a dospívající od 40 kg tělesné hmotnosti (od 12 let)

Užívejte 1 tabletu jako úvodní dávku a poté 1 tabletu každých 8 hodin podle potřeby.

Nepřekračujte dávku 3 tablety (1 200 mg ibuprofenu) denně.

Přípravek Epimid je tableta s řízeným uvolňováním s dvouvrstvou technologií. První vrstva se rychle rozpouští a vstřebává, takže se rychle dostane ke zdroji bolesti. Druhá vrstva je navržena tak, aby pomalu uvolňovala léčivo v těle a udržovala účinnou hladinu ibuprofenu v krvi po delší dobu a poskytovala úlevu po dobu 8 hodin.

Tablety s řízeným uvolňováním.

Dodržujte minimální interval 8 hodin mezi dvěma dávkami.

Nekombinujte s přípravky s okamžitým uvolňováním ibuprofenu, kde je dávkovací interval 4-6 hodin.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním
ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

logo Zentiva

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
