

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

IBOVAL RAPID 400 mg měkké tobolky

ibuprofen

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna měkká tobolka obsahuje 400 mg ibuprofenu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sorbitol. Další informace najdete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

měkká tobolka

10 měkkých tobolek

20 měkkých tobolek

30 měkkých tobolek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

<b>10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
------------------------------------------------------------

STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel  
Německo

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA</b>
------------------------------------

Reg. č.: 29/452/20-C

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Lot

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

Bolest hlavy a zubů  
Bolest svalů a kloubů při nachlazení  
Horečka  
Menstruační bolest

Ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, menstruační bolest, bolest zubů, horečka a bolest spojená s nachlazením.

Pro dospělé a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let).

Přípravek není určen pro dospívající s tělesnou hmotností pod 40 kg nebo děti mladší než 12 let.

Dávkování

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let).

Úvodní dávka je 1 tobolka (400 mg ibuprofenu), poté lze v případě potřeby užívat 1 tobolku každých šest hodin. Neužívejte více než 3 tobolky (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.

Pokud je u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se příznaky onemocnění zhoršují, poraďte se s lékařem.

Pokud je u dospělých nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny v případě horečky a déle než 4 dny k léčbě bolesti, nebo pokud se příznaky onemocnění zhoršují, poraďte se s lékařem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
----------------------------------------

iboval rapid 400 mg měkké tobolky

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
----------------------------------------------------

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--------------------------------------------------------

Neuplatňuje se.

<b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b>
-----------------------------------------------------------

<b>BLISTR</b>
---------------

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

IBOVAL RAPID 400 mg měkké tobolky

ibuprofen

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--------------------------------------------------

STADA Arzneimittel AG

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

EXP

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

Lot

<b>5. JINÉ</b>
----------------