

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU
Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VIATROMB Forte Spray Gel
heparinum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 g gelu obsahuje heparinum natricum 2400 I.U. (což odpovídá 458 I.U. v jednom stříku, který odpovídá 0,19 g)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ethanol 96% (V/V), sójový lecithin, dihydrogenfosforečnan draselný, hydroxid sodný, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

gel, 11,5 g (20 g) (25 g)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C
Použitelnost po prvním otevření 6 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Bisamberg, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

85/238/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Informace pro použití přiložena. Návod k použití: Přípravek se nanáší na kůži v postiženém místě a jeho okolí 1-3krát denně 4 stříky a vmasíruje se. Při zánětech žil se nesmí vmasírovat, pouze jemně nanést.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

VIATROMB

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU
Štítek na lahvičce 20 g/25 g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VIATROMB Forte Spray Gel
heparinum natricum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

1 g gelu obsahuje heparinum natricum 2400 I.U. (což odpovídá 458 I.U. v jednom stříku, který odpovídá 0,19 g)

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: ethanol 96% (V/V), sójový lecithin, dihydrogenfosforečnan draselný, hydroxid sodný, čištěná voda

4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

gel, 20 g (25 g)

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C
Použitelnost po prvním otevření 6 měsíců.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CYATHUS Exquirere PharmaforschungsGmbH, Bisamberg, Rakousko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

85/238/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Informace pro použití přiložena. Návod k použití: Přípravek se nanáší na kůži v postiženém místě a jeho okolí 1-3krát denně 4 stříky a vmasíruje se. Při zánětech žil se nesmí vmasírovat, pouze jemně nanést.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU
Štítek na lahvičce 11,5 g

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

VIATROMB Forte Spray Gel
heparinum natricum
gel, 11,5 g

2. ZPŮSOB PODÁNÍ

Kožní podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

heparinum natricum 458 I.U. v jednom stříku, který odpovídá 0,19 g

6. JINÉ

Informace pro použití přiložena. Návod k použití: Přípravek se nanáší na kůži v postiženém místě a jeho okolí 1-3krát denně 4 stříky a vmasíruje se. Při zánětech žil se nesmí vmasírovat, pouze jemně nanést.