

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

papírová krabička

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**ANACID 258 mg/388 mg perorální suspenze**  
magnesii hydroxidum, algeldrati suspensio

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

5 ml suspenze (jeden sáček) obsahuje magnesii hydroxidum 258 mga Algeldrati suspensio, což odpovídá aluminii hydroxidum 388 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: nekrystalizující sorbitol 70 %, ethanol 96%, kyselina benzoová, natrium-benzoát

Další údaje najdete v příbalové informaci.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze  
12 sáčků po 5 ml  
30 sáčků po 5 ml

### 5. ZPŮSOB A CESTA/ CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
Chraňte před mrazem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Teva B. V., Swensweg 5, 2031GA Haarlem, Nizozemsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ ČÍSLA**

Reg. č.: 09/225/89-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pomáhá při pálení žáhy, nadýmání a žaludečních potížích.

*Dospělí a dospívající nad 14 let:*

Individuální, při dlouhodobé léčbě se obvykle podává 4-6 krát denně 5 ml (= 1 sáček), a to 1 až 3 hodiny po jídle. U některých méně závažných stavů se podává jednorázově 1 sáček při obtížích. Bez porady s lékařem mohou dospívající nad 14 let a dospělí užívat přípravek maximálně po dobu 2 týdnů.

*Děti a dospívající 6 - 14 let:*

U dětí je obvyklá dávka 1 sáček 2-4krát denně a to 1 až 3 hodiny po jídle, nebo jednorázově 1 sáček při potížích.

Přípravek je však nutno podávat dětem a dospívajícím od 6 do 14 let jen na doporučení lékaře, který rovněž určí dobu léčby.

Před použitím je třeba sáček promnout mezi prsty.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Anacid

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

Sáček 5 ml

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Anacid 258 mg/388 mg perorální suspenze

5 ml suspenze (1 sáček) obsahuje magnesi hydroxidum 258 mg a Algeldrati suspensio, což odpovídá aluminii hydroxidum 388 mg.

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ****3 POUŽITELNOST**

EXP

**4.. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET****6. JINÉ**