

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### PAPÍROVÁ KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

##### **Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastilky**

amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, lidocaini hydrochloridum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

##### **Složení:**

Jedna pastilka obsahuje:

amylmetacresolum 0,6 mg; alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg; lidocaini hydrochloridum 10,0 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: prostý sirup, tekutá glukóza (z pšeničného škrobu, obsahuje oxid siřičitý), kyselina vinná, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, silice máty peprné (obsahuje d-limonen), badyániková silice (obsahuje d-limonen, 4-methoxybenzylalkohol a linalol), chinolinová žluť (E 104), indigokarmín (E 132)

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

pastilka

2 pastilky

6 pastilek

8 pastilek

12 pastilek

16 pastilek

24 pastilek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ

Orální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č. ČR: 69/310/98-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pro úlevu od bolesti v krku.

K léčbě příznaků zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu (bolest v krku, afty, zánět dásní).

**Dávkování:**

Dospělí a dospívající od 12 let: Jednu pastilku nechte volně rozpustit v ústech každé 2 až 3 hodiny; neužívejte více než 8 pastilek denně.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Přetrvávají-li u Vás příznaky onemocnění déle než 3 dny, vyhledejte lékaře.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

strepsils plus

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH****BLISTR****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastilky

amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzyllicus, lidocaini hydrochloridum

**2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. JINÉ**