

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paracetamol/Ibuprofen Zentiva 500 mg/200 mg potahované tablety
paracetamol/ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 500 mg paracetamolu a 200 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

potahovaná tableta

10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Tento přípravek se má používat pouze při bolesti mírné až střední intenzity a pouze v případě, že zmírnění bolesti nebylo dostatečné po užití samotného paracetamolu nebo samotného ibuprofenu.

Obsahuje paracetamol.

Vyšší než doporučené dávky mohou způsobit vážné poškození jater.

Neužívejte přípravek Paracetamol/Ibuprofen Zentiva, pokud již užíváte jiné léky proti bolesti obsahující paracetamol, jakékoli jiné přípravky snižující bolest, včetně ibuprofenu, vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních protizánětlivých léků.

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 29/381/20-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek Paracetamol/Ibuprofen Zentiva se používá ke krátkodobé úlevě od mírné až středně silné bolesti spojené s migrénou, bolesti hlavy, bolesti zad, menstruační bolesti, bolesti zubů, svalové bolesti, příznaků nachlazení a chřipky, bolesti v krku a horečky.

Dospělí užívají 1 tabletu až 3krát denně mezi jídlem nebo po jídle a zapíjejí ji vodou. Interval mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 6 hodin.

Pokud 1 tableta nezmírní příznaky, lze užít maximálně 2 tablety 3krát denně. Jednorázová dávka 2 tablety je určena pouze pro pacienty s tělesnou hmotností nad 60 kg.

Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin (což odpovídá 1 200 mg ibuprofenu a 3 000 mg paracetamolu denně).

Není určeno pro děti a dospívající do 18 let.

Neužívejte tento přípravek déle než 3 dny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se se svým lékařem.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

paracetamol/ibuprofen zentiva

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

BLISTR

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Paracetamol/Ibuprofen Zentiva 500 mg/200 mg potahované tablety
paracetamol/ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

logo Zentiva

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
