

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

NUROFEN PRO DĚTI JAHODA 20 mg/ml perorální
suspenze ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK

Složení:

Jeden ml perorální suspenze obsahuje 20 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Přípravek obsahuje maltitol (E 965), propylenglykol a sodík.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

perorální suspenze

100 ml

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

UPOZORNĚNÍ:

Nepřekračujte doporučené dávky.

V členské zemi EHP, ze které je tento přípravek dovážen, je přípravek registrován pod názvem Nurofen Junior Fiebersaft Erdbeer, tento název je uveden na lahvičce. Text na lahvičce je cizojazyčný. Překlad textu je uveden v příbalové informaci.

8. POUŽITELNOST

EXP

Spotřebujte do 6 měsíců po prvním otevření.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

Reg. č. ČR: 29/148/06/-C/PI/044/21

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

ke snížení horečky a tlumení bolesti u dětí
od 3 měsíců
stříkačka pro perorální podání

Nurofen pro děti Jahoda je určen pro děti starší 3 měsíců. Užívá se k snížení horečky (včetně horečky vzniklé po očkování) a k tlumení mírné až středně silné bolesti jako je bolest hlavy, bolest zubů, bolest v krku či bolest spojená s podvrtnutím nebo zhmožděním. Před použitím je třeba obsah lahvičky řádně protřepat.

Dávkování při horečnatých a bolestivých stavech:

3 – 12 měsíců	2,5 ml suspenze	3 x denně
1 – 2 roky	2,5 ml suspenze	3 – 4 x denně
3 – 7 let	5 ml suspenze	3 – 4 x denně
8 - 12 let	5 ml - 10 ml suspenze	3 – 4 x denně

Orientační příklad dávkování podle hmotnosti dítěte:*

Hmotnost (kg)	Dávka ibuprofenu/den (mg)	Množství suspenze /den (ml)
5	100	5
6	120	6
8	160	8
10	200	10
12	240	12
14	280	14
16	320	16
18	360	18
20	400	20
30	max 500	max 25 ml

* použita spodní hranice doporučené dávky ibuprofenu 20 mg/ kg / den

Odstup mezi jednotlivými dávkami je 6-8 hodin.

Dávkování při horečce vzniklé po očkování:

Léčivý přípravek se podá jednorázově v dávce 2,5 ml suspenze. Pokud horečka neklesá, je možno po 6 hodinách podat dalších 2,5 ml suspenze. Nepodávejte více než 2 x 2,5 ml suspenze během 24 hodin. Neklesne-li horečka ani po druhé dávce, další dávku již nepodávejte a o dalším postupu se poradte s lékařem.

16. INFORMACE V BRAILLLOVĚ PÍSMU

nurofen pro děti jahoda

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se

EAN KÓD -8595561101645