

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Dolirief 400 mg potahované tablety

ibuprofen jako ibuprofen-lysin

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu (to odpovídá 684 mg ibuprofen-lysinu).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Další informace naleznete v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

10 tablet

12 tablet

20 tablet

24 tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana – Črnuče

Slovinsko

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 29/1047/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Dolirief se používá ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, migréna, bolest zubů, menstruační bolest, bolest svalů, bolest zad, dále k léčbě horečky a horečnatých stavů a příznaků souvisejících s běžným nachlazením nebo chřipkou.

Dávkování:

K podání ústy a pouze ke krátkodobému použití.

Užívejte nejnižší možnou dávku po nejkratší dobu, potřebnou ke zmírnění příznaků.

Použití u dospělých a dospívajících s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let): Užívejte 1 tabletu až 3x denně podle potřeby, zapíjejte vodou. Mezi dávkami dodržujte odstup alespoň šest hodin.

Neužívejte více než tři tablety (1200 mg ibuprofenu) během 24 hodin.

Nepodávejte dospívajícím s tělesnou hmotností do 40 kg a dětem do 12 let.

Pokud je u dětí a dospívajících ve věku od 12 do 18 let tento léčivý přípravek potřeba déle než 3 dny nebo pokud nastane zhoršení příznaků, je nutné se poradit s lékařem.

U dospělých: poraďte se s lékařem, pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, nebo pokud je přípravek potřebný déle než 5 dní při léčbě bolesti a 3 dny při léčbě migrény nebo horečky

Upozornění: Neužívejte více léku, než je uvedeno na obalu.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

dolirief 400 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH**Blistry****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Dolirief 400 mg potahované tablety ibuprofen

jako ibuprofen-lysin

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alkaloid – INT d.o.o. (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ