

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fanin 1 mg/g gel  
dimetinden-maleinát

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, karbomer 974 P, propylenglykol (E 1520), dinatrium-edetát, hydroxid sodný 10% (pro úpravu pH), čištěná voda.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel  
30 g

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Kožní podání.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP  
Doba použitelnosti po prvním otevření: 18 měsíců.

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.  
Jesienna 9, 80-298 Gdańsk  
Polsko

{logo Ziaja}

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Registrační číslo: 46/085/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Antihistaminikum s místním antipruritickým a antialergickým účinkem

Aplikujte v tenké vrstvě na postiženou a svědící oblast kůže 2-4krát denně.

Použití:

Zmírnění svědění při kožních onemocněních jako jsou kožní vyrážky a kopřivka, dále při poštipání hmyzem, spálení sluncem a povrchových popáleninách kůže 1. stupně (zčervenání kůže).

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

fanin

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

TUBA

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fanin 1mg/g gel  
dimetinden-maleinát

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden gram gelu obsahuje 1 mg dimetinden-maleinátu.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: benzalkonium-chlorid, karbomer 974 P, propylenglykol (E 1520), dinatrium-edetát, hydroxid sodný 10% (pro úpravu pH), čištěná voda.

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

gel  
30 g

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Kožní podání.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

### 8. POUŽITELNOST

EXP  
Doba použitelnosti po prvním otevření: 18 měsíců.

### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.  
Jesienna 9, 80-298 Gdańsk  
Polsko

{logo Ziaja}

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

Registrační číslo: 46/085/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Aplikujte v tenké vrstvě na postiženou a svědící oblast kůže 2-4krát denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**