

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol chřipka a kašel 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid

Pro dospělé a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje: 500 mg paracetamolu, 6,1 mg fenylefrin-hydrochloridu, 100 mg guaifenesinu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Tvrdé tobolky

8, 16 tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání. Nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Držitel rozhodnutí o registraci:

Haleon Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

logo Haleon

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. č.: 07/198/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Na co se používá Panadol chřipka a kašel?

Panadol chřipka a kašel se užívá krátkodobě k úlevě od příznaků nachlazení a chřipky, jako jsou mírná až středně silná bolest, horečka, ucpaný nos a vlhký, produktivní kašel.

Jak užívat Panadol chřipka a kašel?

Dospělí, starší osoby a dospívající od 16 let s tělesnou hmotností od 50 kg: 2 tobolky každých 4 až 6 hodin podle potřeby. Celková denní dávka nemá překročit 6 tobolek/24 hodin. Doba léčby nemá překročit 3 dny.

Polkněte celé bez kousání. Zapijte vodou.

Tento léčivý přípravek nemají užívat děti a dospívající do 16 let a dospívající ve věku 16 – 18 let s tělesnou hmotností nižší než 50 kg.

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Kontaktujte lékaře, pokud příznaky onemocnění přetrvávají déle než 3 dny nebo se zhorší.

Obsahuje paracetamol.

Neužívejte s jinými přípravky obsahujícími paracetamol.

V případě předávkování je potřeba ihned vyhledat lékařskou pomoc, i když se cítíte dobře.

Neužívejte s jinými přípravky na kašel, nachlazení nebo rýmu nebo s alkoholem.

Neužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Poradte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat:

- pokud užíváte jiné léčivé přípravky;
- pokud jste v lékařské péči.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

panadol chřipka a kašel

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Panadol chřipka a kašel 500 mg/100 mg/6,1 mg tvrdé tobolky
paracetamol, guaifenesin, fenylefrin-hydrochlorid

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Haleon Czech Republic s.r.o.

logo Haleon

3. POUŽITELNOST

EXP (bude vytištěno ve sváru)

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot (bude vytištěno ve sváru)

5. JINÉ