

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA (OTC status)****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Paracetamol Zentiva 500 mg tablety  
paracetamol

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tableta obsahuje 500 mg paracetamolu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK****4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Tableta.

10 tablet  
12 tablet  
16 tablet  
20 tablet  
24 tablet  
30 tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

Užívání vyšších, než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. Obsahuje paracetamol. Neužívejte současně jiné léky obsahující paracetamol.  
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte onemocněním jater.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/037/21-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- Používá se ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, zubů, menstruační bolest, bolest svalů a kloubů při chřipce a nachlazení a/nebo při horečce.

Přibližný věk	Tělesná hmotnost	Jednotlivá dávka	Maximální denní dávka
6–8 let	21–24 kg	½ tablety (250 mg)	2 tablety (1 g)
9–10 let	25–33 kg	½ tablety (250 mg)	3 tablety (1,5 g)
10–12 let	34–41 kg	1 tableta (500 mg)	4 tablety (2 g)
12–15 let	42–49 kg	1 tableta (500 mg)	5 tablet (2,5 g)
> 15 let	50–60 kg	1 tableta (500 mg)	6 tablet (3 g)
	> 60 kg	1–2 tablety (500–1000 mg)	6 tablet (3 g)*

\* Maximální denní dávku 8 tablet (4 g) mohou užívat pacienti s tělesnou hmotností nad 60 kg pouze po konzultaci s lékařem.

Jednotlivá dávka může být podle potřeby opakována v intervalu nejméně 4 – 6 hodin.

Není určeno pro děti mladší 6 let s tělesnou hmotností nižší než 21 kg.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

Paracetamol Zentiva 500 mg

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se

<b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b>
---

<b>BLISTR</b>
---------------

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

Paracetamol Zentiva 500 mg tablety  
paracetamol

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

Zentiva logo

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

EXP

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

Lot

<b>5. JINÉ</b>
----------------