

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen Alkaloid-INT 50 mg/g gel  
ibuprofen

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden g gelu obsahuje 50 mg ibuprofenu.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: poloxamer 407, isopropylidenglycerol, isopropylalkohol, triacylglyceroly se středním řetězcem, levandulová silice (obsahuje linalol, d-limonen), pomerančová silice (obsahuje d-limonen, citral, citronellol) a čištěná voda. Další informace naleznete v příbalové informaci.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g gelu  
100 g gelu

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

#### 8. POUŽITELNOST

EXP  
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ALKALOID - INT d.o.o.  
Šlandrova ulica 4  
1231 Ljubljana-Črnuče  
Slovinsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 29/415/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ibuprofen Alkaloid-INT se používá u dospělých a dospívajících od 14 let k zevní podpůrné symptomatické léčbě bolesti při:

- otoku nebo zánětu měkkých tkání přiléhající ke kloubům (např. burs, šlach, šlachových pochev, vazů a kloubního pouzdra),
- akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmoždění v oblasti končetin po tupých poraněních, např. při sportovních úrazech.

Gel se má používat v nejnižší účinné dávce po nejkratší dobu nezbytnou k potlačení příznaků onemocnění.

Doporučené dávkování naleznete v příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

ibuprofen alkaloid-int 50 mg/g gel

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****TUBA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Ibuprofen Alkaloid-INT 50 mg/g gel  
ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden g gelu obsahuje 50 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Pomocné látky: poloxamer 407, isopropylidenglycerol, isopropylalkohol, triacylglyceroly se středním řetězcem, levandulová silice (obsahuje linalol, d-limonen), pomerančová silice (obsahuje d-limonen, citral, citronellol) a čištěná voda. Další informace naleznete v příbalové informaci.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Gel

50 g gelu  
100 g gelu

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Kožní podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP  
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

ALKALOID - INT d.o.o.  
Šlandrova ulica 4  
1231 Ljubljana-Črnuče  
Slovinsko

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg.č.: 29/415/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Ibuprofen Alkaloid-INT se používá u dospělých a dospívajících od 14 let k zevní podpůrné symptomatické léčbě bolesti při:

- otoku nebo zánětu měkkých tkání přiléhajících ke kloubům (např. burs, šlach, šlachových pochev, vazů a kloubního pouzdra),
- akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním v oblasti končetin po tupých poraněních, např. sportovních úrazech.

Gel se má používat v nejnižší účinné dávce po nejkratší dobu nezbytnou k potlačení příznaků onemocnění.

Doporučené dávkování naleznete v příbalové informaci.

**16. INFORMACE V BRILLOVÉ PÍSMU**

Neuplatňuje se.

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.