

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium Pharmavit 500 mg šumivé tablety

Calcii carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje 17,9 mg sodíku.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20 šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

(logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 39/472/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek je určen k prevenci a léčbě stavů z nedostatku vápníku.

Neurčí-li lékař jinak, užívají děti od 5 let a dospívající 1krát denně 1 tabletu.

Dospělí užívají 1-2krát denně 1 tabletu.

Šumivé tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody, která se po úplném rozpuštění tablety vypije.

Přípravek se užívá nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

calcium 500 mg pharmavit

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Calcium Pharmavit 500 mg šumivé tablety

Calcii carbonas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje calcii carbonas 1250 mg (odpovídá 500 mg vápníku).

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Jedna šumivá tableta obsahuje 17,9 mg sodíku.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

20 šumivých tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel
Německo

(logo)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 39/472/93-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Přípravek je určen k prevenci a léčbě stavů z nedostatku vápníku.

Neurčí-li lékař jinak, užívají děti od 5 let a dospívající 1krát denně 1 tabletu.

Dospělí užívají 1-2krát denně 1 tabletu.

Šumivé tablety se užívají rozpuštěné ve sklenici vody, která se po úplném rozpuštění tablety vypije.

Přípravek se užívá nejlépe při jídle nebo bezprostředně po jídle.

Podrobnější informace o dávkování jsou uvedeny v příbalové informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Neuplatňuje se (pouze na krabičce)

19. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

20. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.