

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNEJŠÍM OBALU A VNITŘÍM OBALU

### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**Gaviscon Duo Efekt 500 mg/213 mg/325 mg perorální suspenze**  
natrii alginas / natrii hydrogenocarbonas / calcii carbonas

### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

10 ml suspenze obsahuje natrii alginas 500 mg; natrii hydrogenocarbonas 213 mg a calcii carbonas 325 mg.

### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou způsobit alergické reakce (které se mohou objevit opožděně).

### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

150 ml láhev  
200 ml láhev  
250 ml láhev  
300 ml láhev  
500 ml láhev  
600 ml láhev

### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím dobře protřepejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Pokud příznaky trvají déle než 7 dnů, poradte se s lékařem.

Přípravek s vysokým obsahem sodíku. Další informace viz příbalová informace. Obsahuje vápník. Pokud Vám bylo doporučeno, abyste dodržoval(a) dietu s omezením solí sodíku a vápníku, poraďte se prosím se svým lékařem, dříve než začnete užívat tento přípravek.

Před prvním použitím tohoto přípravku zkontrolujte, zda není poškozený těsnící kryt.

## 8. POUŽITELNOST

EXP

## 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před chladem a mrazem.

## 10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny. (vnější obal)

## 11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č. ČR: 09/1052/10-C

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

**Dospělí a děti věku 12 let a starší:** Užívejte 10 – 20 ml (dvě až čtyři 5ml lžíce) po jídle nebo večer před spaním, nebo jak je doporučeno, maximálně čtyřikrát denně.

**Děti mladší než 12 let:** Používejte pouze na doporučení lékaře.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

gaviscon duo efekt suspenze