

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### KRABÍČKA

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

**STREPFEN 8,75 mg pastilky**

**flurbiprofenum**

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jedna pastilka obsahuje flurbiprofenum 8,75 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Dále obsahuje makrogol 300, hydroxid draselný, citronové aroma (obsahuje butylhydroxyanisol (E 320), citral, citronellol, d-limonen, farnesol, geraniol a linalol), levomenthol, tekutá Glukosa(z pšeničného škrobu), prostý sirup (obsahuje sacharózu), čištěný med

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

16, 24 pastilek

#### 5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

##### Upozornění:

Text na blistru je v cizím jazyce.

Na vnitřním blistru je uveden název Strepsils 8,75 mg Lutschtabletten. Pod tímto názvem je tento léčivý přípravek registrován v členské zemi EHP, zekteré je dovážen.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI****Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

**Souběžný dovozce:**

Pharmedex s.r.o, Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

69/161/02-C/PI/025/19

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Pastilky **Streptfen** zmírňují bolest a otok v krku, které doprovázejí zánětlivá a infekční onemocnění dutiny ústní a hltanu bakteriálního nebo virového původu (např. při angině).

**Dávkování:**

Dospělí a dospívající starší 12 let: jedna pastilka se nechá rozpustit v ústech každých 3 - 6 hodin. Neužívejte více než 5 pastilek během 24 hodin. Při rozpouštění přemísťujte pastilku v ústech.

Streptfen není určený pro děti do 12 let.

Úleva od bolesti a otoku v krku

<b>16.      INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
---

Streptfen 8,75 mg pastilky

<b>17.      JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
---

Neuplatňuje se.

<b>18.      JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
---

Neuplatňuje se.