

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA PRO TUBU****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

ACC Long 600 mg šumivé tabletyacetylcysteinum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna šumivá tableta obsahuje acetylcysteinum 600 mg.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje laktózu, sodík a sorbitol (E 420), další údaje viz příbalová informace.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

20 šumivých tablet

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.  
Perorální podání.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****Upozornění:**

Text na tubě je v němčině.

**8. POUŽITELNOST**

EXP

Doba použitelnosti po prvním otevření: 2 roky

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

<b>10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ</b>
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

<b>11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

**Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:**

Hexal AG, 83607 Holzkirchen, Německo

Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

**Souběžný dovozce, přebalil:**

Best Pharm a.s., Beranových 65, Praha 9 – Letňany, 199 02, Česká republika

<b>12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO</b>
------------------------------

52/973/95-C/PI/002/15

<b>13. ČÍSLO ŠARŽE</b>
------------------------

Č. šarže

<b>14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ</b>
----------------------------------

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

<b>15. NÁVOD K POUŽITÍ</b>
----------------------------

Uspadňuje odkašlávání, uvolňuje zahlenění

K léčbě onemocnění dýchacích cest provázených tvorbou vazkého hlenu a vlhkým kašlem.

Dávkování: dospívající od 14 let a dospělí užívají 1 šumivou tabletu jednou denně.

Šumivou tabletu rozpustíte v 1/2 sklenice teplé nebo studené vody.

Roztok se užívá ihned po rozpuštění tablety; nejpozději a výjimečně do 2 hodin po rozpuštění.

Pro dospělé a dospívající od 14 let.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

acc long

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.