

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABÍČKA

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen STADA 200 mg potahované tablety

Ibuprofen STADA 400 mg potahované tablety

ibuprofen

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg ibuprofenu.

Jedna potahovaná tableta obsahuje 400 mg ibuprofenu.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Potahovaná tableta

Ibuprofen STADA 200 mg potahované tablety

10 potahovaných tablet

12 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet

24 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

40 potahovaných tablet

48 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

Ibuprofen STADA 400 mg potahované tablety

10 potahovaných tablet

12 potahovaných tablet

20 potahovaných tablet

24 potahovaných tablet

30 potahovaných tablet

40 potahovaných tablet

48 potahovaných tablet

100 potahovaných tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 – 18
61118 Bad Vilbel
Německo

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

200 mg: 07/184/21-C
400 mg: 07/185/21-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé symptomatické léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest zubů, bolest při menstruaci a bolest hlavy a/nebo při horečce.

Ibuprofen STADA 200 mg potahované tablety

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let):

Obvyklá dávka je 1 nebo 2 tablety (200-400 mg) v jedné dávce nebo až 3–4x denně podle potřeby. Interval mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 6 tablet (1200 mg) během 24 hodin.

Děti s tělesnou hmotností od 20 kg (7 let) do 39 kg (11 let):

Děti o hmotnosti 20-29 kg (7-9 let): 1 tableta (200 mg) 1–3x denně podle potřeby, s intervaly mezi dávkami nejméně 6 hodin. Maximální denní dávka během 24 hodin nemá překročit 3 tablety (600 mg).

Děti o hmotnosti 30-39 kg (10-11 let): 1 tableta (200 mg) 1–4x denně podle potřeby, s intervaly mezi dávkami nejméně 6 hodin. Maximální denní dávka během 24 hodin nemá překročit 4 tablety (800 mg).

Ibuprofen STADA 400 mg potahované tablety

Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností od 40 kg (od 12 let):

Obvyklá dávka je 1 tableta (400 mg) 1–3x denně podle potřeby. Interval mezi dávkami musí být nejméně 6 hodin. Neužívejte více než 3 tablety (1200 mg) během 24 hodin.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

ibuprofen stada 200 mg

ibuprofen stada 400 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ibuprofen STADA 200 mg potahované tablety

Ibuprofen STADA 400 mg potahované tablety

ibuprofen

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

STADA Arzneimittel AG (logo)

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ
