

## ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

### Krabička

#### 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Olynth 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

#### 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg.

#### 3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: roztok benzalkonium-chloridu, dihydrát dinatrium-edetátu, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, tekutý krystalizující sorbitol 70%, čištěná voda.

#### 4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

nosní sprej, roztok

10 ml

#### 5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

#### 6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

#### 7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

#### 8. POUŽITELNOST

EXP:

#### 9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

McNeil Healthcare (Ireland) Limited  
Offices 5-7  
Block 5  
High Street  
Tallaght  
Dublin 24  
Irsko  
D24 YK8N

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

69/1030/93-B/C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

pro děti od 2 do 7 let  
léčba rýmy  
uvolnění vedlejších nosních dutin

Návod k použití: Odstraňte ochranný kryt. Před prvním použitím několikrát stiskněte rozprašovač (obr.1), dokud se poprvé neobjeví souvislý obláček aerosolu. Nosní sprej je tímto připraven k dalšímu použití. Při aplikaci stiskněte pouze jednou rozprašovač (obr.2) a lehce vdechněte nosem. Lahvičku s přípravkem držte svisle. Nevstříkujte dávku přípravku držením nosního spreje ve vodorovné poloze nebo v poloze dnem lahvičky vzhůru. Po použití nasad'te opět na rozprašovač ochranný kryt.



Dávkování: děti od 2 do 7 let 3x denně 1 dávka do každé nosní dírky.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

olynth 0,5 mg/ml

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****Etiketa na lahvičce****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Olynth 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok

xylometazolini hydrochloridum

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

nosní podání

**3. POUŽITELNOST**

EXP:

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot:

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

10 ml

**6. JINÉ**

pro děti od 2 do 7 let

léčba rýmy

uvolnění vedlejších nosních dutin

logo McNeil Healthcare (Ireland) Ltd.