

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****PAPÍROVÁ KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Relivio 1 mg/ml nosní sprej, roztok

azelastin-hydrochlorid

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna dávka o 0,14 ml obsahuje 0,14 mg azelastin-hydrochloridu, což odpovídá 0,13 mg azelastinu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Hypromelosa, dinatrium-edetát, kyselina citronová, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, čištěná voda.

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Nosní sprej, roztok

1 x 10 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Nosní podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Datum prvního otevření:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Chraňte před chladem a mrazem.

Skladujte při teplotě do 25 °C.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

**Držitel rozhodnutí o registraci:**

Dr. Max Pharma s.r.o.  
Na Florenci 2116/15  
Nové Město  
110 00 Praha 1  
Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 24/1049/16-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Relivio se používá k léčbě příznaků sezónní alergické rýmy (např. senné rýmy) a akutních exacerbací (záchvatů) celoroční alergické rýmy.  
Určeno pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let.  
Doporučená dávka je jeden vstřík (0,14 ml) do každé nosní dírky dvakrát denně.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

relivio 1 mg/ml nosní sprej, roztok

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

<Neuplatňuje se.>

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

<Neuplatňuje se.>

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU**

Štítek na lahvičce

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Relivio 1 mg/ml nosní sprej, roztok

azelastin-hydrochlorid

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Nosní podání

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

10 ml nosní sprej, roztok

**6. JINÉ**

Chraňte před chladem a mrazem.

Skladujte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Určeno pro dospělé, dospívající a děti starší 6 let.