

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****KRABÍČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Aspegola 2,23 mg/ml + 4,46 mg/ml + 6,0 mg/ml orální sprej, roztok  
amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol/monohydrát lidokain-hydrochloridu

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jeden ml orálního spreje, roztoku obsahuje tyto léčivé látky: 2,23 mg amylmetakresolu, 4,46 mg 2,4-dichlorbenzylalkoholu, 7,39 mg monohydrátu lidokain-hydrochloridu (odpovídá 6,0 mg lidokainu)

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Ethanol 96 %, glycerol (E 422), roztok hydroxidu sodného, čištěná voda  
Tekutý nekrystalizující sorbitol (E 420), sodná sůl sacharinu, monohydrát kyseliny citronové  
Erythrosin (E 127)  
Levomenthol, aroma máty peprné, anýzové aroma

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Orální sprej, roztok  
20 ml skleněná lahvička (153 vstříků = 76 dávek)

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Orální podání.  
Při aplikaci spreje zadržte dech.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
Lahvičku uchovávejte v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

BAYER s.r.o., Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

69/031/22-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Č. šarže:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

Aspegola je roztok s anýzovou a mátovou příchutí a vůní určený pro použití ve formě spreje. Je určen k místní krátkodobé antiseptické léčbě a úlevě od bolesti a zánětu v hrdle a dutině ústní (zarudnutí, otok) a dalších bolestivých stavů hrdla u dospělých a dospívajících od 12 let.

Dospělí a dospívající od 15 let: 2 vstříky spreje do úst a/nebo do hrdla jednou až maximálně šestkrát za den

Dospívající ve věku 12 až 15 let: 2 vstříky spreje do úst a/nebo do hrdla jednou až maximálně čtyřikrát za den

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Léčivý přípravek k úlevě od bolesti a zánětu v hrdle a dutině ústní.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Aspegola sprej

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU****SKLENĚNÁ LAHVIČKA****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Aspegola 2,23 mg/ml + 4,46 mg/ml + 6,0 mg/ml orální sprej, roztok  
amylmetakresol/2,4-dichlorbenzylalkohol/monohydrát lidokain-hydrochloridu

**2. ZPŮSOB PODÁNÍ**

Orální podání.  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**3. POUŽITELNOST**

EXP

**4. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET**

20 ml

**6. JINÉ**

Uchovávejte při teplotě do 30 °C  
Lahvičku uchovávejte v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem.