

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**

**KRABÍČKA**

**1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním  
ibuprofen

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 400 mg ibuprofenu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Tablety s řízeným uvolňováním

12 tablet s řízeným uvolňováním

14 tablet s řízeným uvolňováním

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ**

**8. POUŽITELNOST**

EXP

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

**10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

Reg. č.: 07/006/24-C

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

Lot

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

K úlevě od bolesti a horečky  
Dvouvrstvá technologie  
Vstřebává se a působí rychle  
Poskytuje úlevu po dobu 8 hodin

Ke krátkodobé léčbě mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy (včetně migrény), bolest zad, bolest zubů, dysmenorea, bolest svalů a kloubů, bolest po operaci, bolest a horečka při nachlazení a chřipce.

Dospělí a dospívající od 40 kg tělesné hmotnosti (od 12 let)

Užívejte 1 tabletu jako úvodní dávku a poté 1 tabletu každých 8 hodin podle potřeby.

Nepřekračujte dávku 3 tablety (1 200 mg ibuprofenu) denně.

Přípravek Epimid je tableta s řízeným uvolňováním s dvouvrstvou technologií. První vrstva se rychle rozpouští a vstřebává, takže se rychle dostane ke zdroji bolesti. Druhá vrstva je navržena tak, aby pomalu uvolňovala léčivo v těle a udržovala účinnou hladinu ibuprofenu v krvi po delší dobu a poskytovala úlevu po dobu 8 hodin.

**Tablety s řízeným uvolňováním.**

**Dodržujte minimální interval 8 hodin** mezi dvěma dávkami.

**Nekombinujte s přípravky s okamžitým uvolňováním ibuprofenu**, kde je dávkovací interval 4-6 hodin.

<b>16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU</b>
--

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním

<b>17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – 2D ČÁROVÝ KÓD</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD – DATA ČITELNÁ OKEM</b>
--

Neuplatňuje se.

<b>MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH</b>
---

<b>BLISTR</b>
---------------

<b>1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU</b>
------------------------------------

Epimid 400 mg tablety s řízeným uvolňováním  
ibuprofen

<b>2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI</b>
--

logo Zentiva

<b>3. POUŽITELNOST</b>
------------------------

EXP

<b>4. ČÍSLO ŠARŽE</b>
-----------------------

Lot

<b>5. JINÉ</b>
----------------