

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Tříkomorový vak 1 000 ml****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 000 ml
27,5% roztok glukózy	400 ml
14,2% roztok aminokyselin	400 ml
20% lipidová emulze	200 ml

Složení 1 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	40,00 g
Alaninum	8,24 g
Argininum	5,58 g
Acidum asparticum	1,65 g
Acidum glutamicum	2,84 g
Glycinum	3,95 g
Histidinum	3,40 g
Isoleucinum	2,84 g
Leucinum	3,95 g
Lysinum	4,48 g
(ekvivalent lysini acetat)	(6,32 g)
Methioninum	2,84 g
Phenylalaninum	3,95 g
Prolinum	3,40 g
Serinum	2,25 g
Threoninum	2,84 g
Tryptophanum	0,95 g
Tyrosinum	0,15 g
Valinum	3,64 g
Natrii acetat trihydricus	1,50 g
Natrii glycerophosphas hydricus	3,67 g
Kalii chloridum	2,24 g
Magnesii chloridum hexahydricum	0,81 g
Calcii chloridum dihydricum	0,52 g
Glucosum	110,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(121,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	40 g
Aminokyseliny	56,9 g
Dusík	9,0 g
Glukóza	110,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1070 kcal
Neproteinové kalorie	840 kcal
Kalorie - glukóza	440 kcal
Kalorie - lipidy ^a	400 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37%
Elektrolyty:	
Sodík	35,0 mmol
Draslík	30,0 mmol
Hořčík	4,0 mmol
Vápník	3,5 mmol
Fosfát ^b	15,0 mmol
Acetát	54 mmol
Chloridy	45 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 000 ml v 3komorovém vaku

Blue box: Odměrné značky (ryška s číselným údajem) udávající odhadovaný objem v ml tištěné na vaku

1 000 ml 500

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00, Praha 5
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU****17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU**Tříkomorový vak 1 500 ml****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 500 ml
27,5% roztok glukózy	600 ml
14,2% roztok aminokyselin	600 ml
20% lipidová emulze	300 ml

Složení 1 500 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	60,00 g
Alaninum	12,36 g
Argininum	8,37 g
Acidum asparticum	2,47 g
Acidum glutamicum	4,27 g
Glycinum	5,92 g
Histidinum	5,09 g
Isoleucinum	4,27 g
Leucinum	5,92 g
Lysinum	6,72 g
(ekvivalent lysini acetat)	(9,48 g)
Methioninum	4,27 g
Phenylalaninum	5,92 g
Prolinum	5,09 g
Serinum	3,37 g
Threoninum	4,27 g
Tryptophanum	1,42 g
Tyrosinum	0,22 g
Valinum	5,47 g
Natrii acetat trihydricus	2,24 g
Natrii glycerophosphas hydricus	5,51 g
Kalii chloridum	3,35 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,22 g
Calcii chloridum dihydricum	0,77 g
Glucosum	165,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(181,50 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 500 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	60 g
Aminokyseliny	85,4 g
Dusík	13,5 g
Glukóza	165,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1600 kcal
Neproteinové kalorie	1260 kcal
Kalorie - glukóza	660 kcal
Kalorie – lipidy ^a	600 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	52,5 mmol
Draslík	45,0 mmol
Hořčík	6,0 mmol
Vápník	5,3 mmol
Fosfát ^b	22,5 mmol
Acetát	80 mmol
Chloridy	68 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 500 ml v 3komorovém vaku

Blue box: Odměrné značky (ryška s číselným údajem) udávající odhadovaný objem v ml tištěné na vaku

1 500 ml $\frac{1000}{500}$

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).
Pouze k jednorázovému použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.
Sterilní.
Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.
Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.
Nepropojujte do série.
Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00, Praha 5
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU Tříkomorový vak 2 000 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	2 000 ml
27,5% roztok glukózy	800 ml
14,2% roztok aminokyselin	800 ml
20% lipidová emulze	400 ml

Složení 2 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	80,00 g
Alaninum	16,48 g
Argininum	11,16 g
Acidum asparticum	3,30 g
Acidum glutamicum	5,69 g
Glycinum	7,90 g
Histidinum	6,79 g
Isoleucinum	5,69 g
Leucinum	7,90 g
Lysinum	8,96 g
(ekvivalent lysini acetat)	(12,64 g)
Methioninum	5,69 g
Phenylalaninum	7,90 g
Prolinum	6,79 g
Serinum	4,50 g
Threoninum	5,69 g
Tryptophanum	1,90 g
Tyrosinum	0,30 g
Valinum	7,29 g
Natrii acetat trihydricus	2,99 g
Natrii glycerophosphas hydricus	7,34 g
Kalii chloridum	4,47 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,62 g
Calcii chloridum dihydricum	1,03 g
Glucosum	220,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(242,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

2 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	80 g
Aminokyseliny	113,9 g
Dusík	18,0 g
Glukóza	220,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	2140 kcal
Neproteinové kalorie	1680 kcal
Kalorie - glukóza	880 kcal
Kalorie – lipidy ^a	800 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	70,0 mmol
Draslík	60,0 mmol
Hořčík	8,0 mmol
Vápník	7,0 mmol
Fosfát ^b	30,0 mmol
Acetát	107 mmol
Chloridy	90 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

2 000 ml v 3komorovém vaku

Blue box: Odměrné značky (ryška s číselným údajem) udávající odhadovaný objem v ml tištěné na vaku

2 000 ml

1500

1000

800

600

400

200

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojíte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Nemí-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00, Praha 5
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Přepravní krabice 6 x 1000 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 000 ml
27,5% roztok glukózy	400 ml
14,2% roztok aminokyselin	400 ml
20% lipidová emulze	200 ml

Složení 1 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	40,00 g
Alaninum	8,24 g
Argininum	5,58 g
Acidum asparticum	1,65 g
Acidum glutamicum	2,84 g
Glycinum	3,95 g
Histidinum	3,40 g
Isoleucinum	2,84 g
Leucinum	3,95 g
Lysinum	4,48 g
(ekvivalent lysini acetat)	(6,32 g)
Methioninum	2,84 g
Phenylalaninum	3,95 g
Prolinum	3,40 g
Serinum	2,25 g
Threoninum	2,84 g
Tryptophanum	0,95 g
Tyrosinum	0,15 g
Valinum	3,64 g
Natrii acetat trihydricus	1,50 g
Natrii glycerophosphas hydricus	3,67 g
Kalii chloridum	2,24 g
Magnesii chloridum hexahydricus	0,81 g
Calcii chloridum dihydricus	0,52 g
Glucosum	110,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricus)	(121,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	40 g
Aminokyseliny	56,9 g
Dusík	9,0 g
Glukóza	110,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1070 kcal
Neproteinové kalorie	840 kcal
Kalorie - glukóza	440 kcal
Kalorie - lipidy ^a	400 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37%
Elektrolyty:	
Sodík	35,0 mmol
Draslík	30,0 mmol
Hořčík	4,0 mmol
Vápník	3,5 mmol
Fosfát ^b	15,0 mmol
Acetát	54 mmol
Chloridy	45 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 000 ml v 3komorovém vaku: krabice se 6 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
--

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2°C až 8°C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2°C až 8°C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoliv aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě +2°C až +8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00, Praha 5

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Přepravní krabice 5 x 1000 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 000 ml
27,5% roztok glukózy	400 ml
14,2% roztok aminokyselin	400 ml
20% lipidová emulze	200 ml

Složení 1 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	40,00 g
Alaninum	8,24 g
Argininum	5,58 g
Acidum asparticum	1,65 g
Acidum glutamicum	2,84 g
Glycinum	3,95 g
Histidinum	3,40 g
Isoleucinum	2,84 g
Leucinum	3,95 g
Lysinum	4,48 g
(ekvivalent lysini acetat)	(6,32 g)
Methioninum	2,84 g
Phenylalaninum	3,95 g
Prolinum	3,40 g
Serinum	2,25 g
Threoninum	2,84 g
Tryptophanum	0,95 g
Tyrosinum	0,15 g
Valinum	3,64 g
Natrii acetat trihydricus	1,50 g
Natrii glycerophosphas hydricus	3,67 g
Kalii chloridum	2,24 g
Magnesii chloridum hexahydricum	0,81 g
Calcii chloridum dihydricum	0,52 g
Glucosum	110,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(121,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	40 g
Aminokyseliny	56,9 g
Dusík	9,0 g
Glukóza	110,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1070 kcal
Neproteinové kalorie	840 kcal
Kalorie - glukóza	440 kcal
Kalorie - lipidy ^a	400 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37%
Elektrolyty:	
Sodík	35,0 mmol
Draslík	30,0 mmol
Hořčík	4,0 mmol
Vápník	3,5 mmol
Fosfát ^b	15,0 mmol
Acetát	54 mmol
Chloridy	45 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 000 ml v 3komorovém vaku: krabice s 5 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ
--

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2°C až 8°C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2°C až 8°C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25°C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoliv aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě +2°C až +8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ
--

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
--

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00, Praha 5

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Přepravní krabice 4 x 1 500 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 500 ml
27,5% roztok glukózy	600 ml
14,2% roztok aminokyselin	600 ml
20% lipidová emulze	300 ml

Složení 1 500 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	60,00 g
Alaninum	12,36 g
Argininum	8,37 g
Acidum asparticum	2,47 g
Acidum glutamicum	4,27 g
Glycinum	5,92 g
Histidinum	5,09 g
Isoleucinum	4,27 g
Leucinum	5,92 g
Lysinum	6,72 g
(ekvivalent lysini acetat)	(9,48 g)
Methioninum	4,27 g
Phenylalaninum	5,92 g
Prolinum	5,09 g
Serinum	3,37 g
Threoninum	4,27 g
Tryptophanum	1,42 g
Tyrosinum	0,22 g
Valinum	5,47 g
Natrii acetat trihydricus	2,24 g
Natrii glycerophosphas hydricus	5,51 g
Kalii chloridum	3,35 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,22 g
Calcii chloridum dihydricum	0,77 g
Glucosum	165,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(181,50 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 500 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	60 g
Aminokyseliny	85,4 g
Dusík	13,5 g
Glukóza	165,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1600 kcal
Neproteinové kalorie	1260 kcal
Kalorie - glukóza	660 kcal
Kalorie – lipidy ^a	600 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	52,5 mmol
Draslík	45,0 mmol
Hořčík	6,0 mmol
Vápník	5,3 mmol
Fosfát ^b	22,5 mmol
Acetát	80 mmol
Chloridy	68 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 500 ml v 3komorovém vaku: krabice se 4 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00, Praha 5

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**Přepravní krabice 5 x 1 500 ml****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	1 500 ml
27,5% roztok glukózy	600 ml
14,2% roztok aminokyselin	600 ml
20% lipidová emulze	300 ml

Složení 1 500 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	60,00 g
Alaninum	12,36 g
Argininum	8,37 g
Acidum asparticum	2,47 g
Acidum glutamicum	4,27 g
Glycinum	5,92 g
Histidinum	5,09 g
Isoleucinum	4,27 g
Leucinum	5,92 g
Lysinum	6,72 g
(ekvivalent lysini acetat)	(9,48 g)
Methioninum	4,27 g
Phenylalaninum	5,92 g
Prolinum	5,09 g
Serinum	3,37 g
Threoninum	4,27 g
Tryptophanum	1,42 g
Tyrosinum	0,22 g
Valinum	5,47 g
Natrii acetas trihydricus	2,24 g
Natrii glycerophosphas hydricus	5,51 g
Kalii chloridum	3,35 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,22 g
Calcii chloridum dihydricum	0,77 g
Glucosum	165,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(181,50 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

1 500 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	60 g
Aminokyseliny	85,4 g
Dusík	13,5 g
Glukóza	165,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	1600 kcal
Neproteinové kalorie	1260 kcal
Kalorie - glukóza	660 kcal
Kalorie – lipidy ^a	600 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	52,5 mmol
Draslík	45,0 mmol
Hořčík	6,0 mmol
Vápník	5,3 mmol
Fosfát ^b	22,5 mmol
Acetát	80 mmol
Chloridy	68 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

1 500 ml v 3komorovém vaku: krabice s 5 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).
Pouze k jednorázovému použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.
Sterilní.
Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.
Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.
Nepropojujte do série.
Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.
Karla Engliše 3201/6
150 00, Praha 5
Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Přepravní krabice 4 x 2 000 ml

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	2 000 ml
27,5% roztok glukózy	800 ml
14,2% roztok aminokyselin	800 ml
20% lipidová emulze	400 ml

Složení 2 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	80,00 g
Alaninum	16,48 g
Argininum	11,16 g
Acidum asparticum	3,30 g
Acidum glutamicum	5,69 g
Glycinum	7,90 g
Histidinum	6,79 g
Isoleucinum	5,69 g
Leucinum	7,90 g
Lysinum	8,96 g
(ekvivalent lysini acetat)	(12,64 g)
Methioninum	5,69 g
Phenylalaninum	7,90 g
Prolinum	6,79 g
Serinum	4,50 g
Threoninum	5,69 g
Tryptophanum	1,90 g
Tyrosinum	0,30 g
Valinum	7,29 g
Natrii acetat trihydricus	2,99 g
Natrii glycerophosphas hydricus	7,34 g
Kalii chloridum	4,47 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,62 g
Calcii chloridum dihydricum	1,03 g
Glucosum	220,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(242,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

2 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	80 g
Aminokyseliny	113,9 g
Dusík	18,0 g
Glukóza	220,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	2140 kcal
Neproteinové kalorie	1680 kcal
Kalorie - glukóza	880 kcal
Kalorie – lipidy ^a	800 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	70,0 mmol
Draslík	60,0 mmol
Hořčík	8,0 mmol
Vápník	7,0 mmol
Fosfát ^b	30,0 mmol
Acetát	107 mmol
Chloridy	90 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

2 000 ml v 3komorovém vaku: krabice se 4 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00, Praha 5

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**Přepravní krabice 5 x 2 000 ml****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

OLIMEL N9E infuzní emulze

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

	2 000 ml
27,5% roztok glukózy	800 ml
14,2% roztok aminokyselin	800 ml
20% lipidová emulze	400 ml

Složení 2 000 ml po smíchání:

Olivae et sojae oleum raffinatum ^a	80,00 g
Alaninum	16,48 g
Argininum	11,16 g
Acidum asparticum	3,30 g
Acidum glutamicum	5,69 g
Glycinum	7,90 g
Histidinum	6,79 g
Isoleucinum	5,69 g
Leucinum	7,90 g
Lysinum	8,96 g
(ekvivalent lysini acetat)	(12,64 g)
Methioninum	5,69 g
Phenylalaninum	7,90 g
Prolinum	6,79 g
Serinum	4,50 g
Threoninum	5,69 g
Tryptophanum	1,90 g
Tyrosinum	0,30 g
Valinum	7,29 g
Natrii acetat trihydricus	2,99 g
Natrii glycerophosphas hydricus	7,34 g
Kalii chloridum	4,47 g
Magnesii chloridum hexahydricum	1,62 g
Calcii chloridum dihydricum	1,03 g
Glucosum	220,00 g
(ekvivalent glucosum monohydricum)	(242,00 g)

a: Směs rafinovaného olivového oleje (přibližně 80%) a rafinovaného sojového oleje (přibližně 20%) odpovídající poměru esenciálních mastných kyselin/celkových kyselin 20%.

2 000 ml konečné směsi obsahuje:

Lipidy	80 g
Aminokyseliny	113,9 g
Dusík	18,0 g
Glukóza	220,0 g
Energie:	
Celkové kalorie přibl.	2140 kcal
Neproteinové kalorie	1680 kcal
Kalorie - glukóza	880 kcal
Kalorie – lipidy ^a	800 kcal
Poměr neproteinových kalorií/dusíku	93 kcal/g
Poměr kalorií – glukóza/lipidy	52/48
Lipidové/celkové kalorie	37 %
Elektrolyty:	
Sodík	70,0 mmol
Draslík	60,0 mmol
Hořčík	8,0 mmol
Vápník	7,0 mmol
Fosfát ^b	30,0 mmol
Acetát	107 mmol
Chloridy	90 mmol
pH	6,4
Osmolarita	1310 mosm/l

a: Zahrnuje kalorie z přečištěných vaječných fosfolipidů

b: Zahrnuje fosfáty v lipidové emulzi

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Komora s lipidovou emulzí:

Vaječné fosfolipidy přečištěné, glycerol, natrium-oleát, hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem aminokyselin a elektrolytů:

Kyselina octová (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Komora s roztokem glukózy a vápníku:

Kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH), voda pro injekci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Po rekonstituci:

Infuzní emulze

2 000 ml v 3komorovém vaku: krabice s 5 vaky

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Intravenózní podání (centrální žíla).

Pouze k jednorázovému použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Obsahuje elektrolyty.

Sterilní.

Nepodávejte před, během nebo po infuzi krve stejným infuzním setem.

Použijte pouze v případě, že roztoky aminokyselin a glukózy jsou čiré, lipidová emulze a konečná směs po rekonstituci jsou homogenní a mléčně zbarvené a vak není poškozen.

Nepropojujte do série.

Podávejte pouze po protržení těsnících švů a smíchání obsahu všech 3 komor. Po rekonstituci přípravek ihned použijte.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v ochranném obalu.

Po rekonstituci:

Doporučuje se použít přípravek ihned po protržení těsnících švů mezi 3 komorami. Stabilita rekonstituované emulze byla prokázána po dobu 7 dní u použití při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Po přidání aditiv (elektrolytů, stopových prvků, vitamínů):

Po přidání aditiv byla stabilita směsi prokázána po dobu 7 dní při teplotě 2 °C až 8 °C a dále po dobu 48 hodin při teplotě nepřesahující 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska je nutné po přidání jakéhokoli aditiva směs použít okamžitě. Není-li použita okamžitě, zodpovídá za dobu použitelnosti a podmínky uchovávání před použitím uživatel. Tato doba by za běžných podmínek neměla být delší než 24 hodin při teplotě + 2 °C až + 8 °C, pokud aditiva nebyla přidána v kontrolovaných a validovaných aseptických podmínkách.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BAXTER CZECH spol. s r.o.

Karla Engliše 3201/6

150 00, Praha 5

Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

76/384/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

Nevyžaduje se – odůvodnění přijato