

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU****OZNAČENÍ KRABÍČKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup  
ambroxoli hydrochloridum

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

5 ml sirupu obsahuje 30 mg ambroxol - hydrochloridu. Jeden ml sirupu obsahuje 6 mg ambroxol - hydrochloridu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje kyselinu benzoovou (E 210) a propylenglykol (E 1520) (obsažen v jahodovém a vanilkovém aroma).

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup  
100 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****8. POUŽITELNOST**


Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

## 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

52/231/05-C/PI/008/25

## 13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

## 14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

## 15. NÁVOD K POUŽITÍ

- uvolňuje zahlenění
- usnadňuje vykašlávání
- zmírňuje kašel

Věk	Dávkování
Dospělí a dospívající nad 12 let	5 ml 3krát denně Účinnost lze zvýšit podáním 10 ml sirupu 2krát denně.
<i>Je možno podat na doporučení lékaře i dětem do 12 let. V tom případě je doporučováno následující schéma dávkování:</i>	
Děti 6 - 12 let	2,5 ml 2 – 3krát denně
Děti 2 - 5 let	1,25 ml 3krát denně
Děti 1 - 2 roky	1,25 ml 2krát denně


Mukolytická léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Po prvním otevření spotřebujte do 6 měsíců.


## 16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Mucosolvan pro dospělé

## 17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

 Neuplatňuje se.

## 18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

 Neuplatňuje se.

**ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU****OZNAČENÍ LAHVIČKY****1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Mucosolvan pro dospělé 30 mg/5 ml sirup  
ambroxol - hydrochlorid

**2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK**

5 ml sirupu obsahuje 30 mg ambroxol - hydrochloridu.

**3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK**

Obsahuje kyselinu benzoovou (E 210) a propylenglykol (E 1520) (obsažen v jahodovém a vanilkovém aroma).

**4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ**

Sirup  
200 ml

**5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání  
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

**6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

**7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ****Upozornění:**


Text na lahvičce je v cizím jazyce. Překlad textu je uveden v Příbalové informaci.

**8. POUŽITELNOST**

Použitelné do:

**9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ****10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ****11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Držitel rozhodnutí o registraci referenčního přípravku v ČR:

Opella Healthcare Czech s.r.o., Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6, Česká republika/ 

Souběžný dovozce:

Pharmedex s.r.o., Lisabonská 799/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika

**12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA**

52/231/05-C/PI/008/25

**13. ČÍSLO ŠARŽE**

č.š.:

**14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ**

**15. NÁVOD K POUŽITÍ**

- uvolňuje zahlenění
- usnadňuje vykašlávání
- zmírňuje kašel

Věk	Dávkování
Dospělí a dospívající nad 12 let	5 ml 3krát denně Účinnost lze zvýšit podáním 10 ml sirupu 2krát denně.
<i>Je možno podat na doporučení lékaře i dětem do 12 let. V tom případě je doporučováno následující schéma dávkování:</i>	
Děti 6 - 12 let	2,5 ml 2 – 3krát denně
Děti 2 - 5 let	1,25 ml 3krát denně
Děti 1 - 2 roky	1,25 ml 2krát denně

Mukolytická léčba akutních onemocnění dýchacího ústrojí, která jsou spojena s abnormální sekrecí hlenu a poruchou jeho transportu.

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

**16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**

mucosolvan pro dospělé

**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD**

Neuplatňuje se.

**18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**

Neuplatňuje se.