

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g
50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
200 g

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.
Datum otevření:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Müller Pharma s.r.o.
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/412/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Diclofenac Dr. Müller Pharma se u dospělých používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, natažením a pohmožděním. U dospívajících od 14 let ke krátkodobé místní úlevě od bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.

Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

diclofenac dr. müller pharma 10 mg/g gel

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM
--

Neuplatňuje se.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba (30 g)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

30 g

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Müller Pharma s.r.o.
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/412/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Diclofenac Dr. Müller Pharma se u dospělých používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, natažením a pohmožděním. U dospívajících od 14 let ke krátkodobé místní úlevě od bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.

Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Tuba (50 g, 60 g, 100 g, 120 g, 150 g a 200 g)

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Diclofenac Dr. Müller Pharma 10 mg/g gel
sodná sůl diklofenaku

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY

Jeden gram gelu obsahuje 10 mg sodné soli diklofenaku.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Seznam pomocných látek: triacylglyceroly se středním řetězcem, propylenglykol (E 1520), karbomery, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), hydroxid sodný (E 524), hyetelosa, čištěná voda.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Gel

50 g
60 g
100 g
120 g
150 g
200 g

5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Kožní podání. Pouze k vnějšímu použití.
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

EXP
Po prvním otevření spotřebujte do 12 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ**11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Dr. Müller Pharma s.r.o.
U Mostku 182, Pouchov, 503 41 Hradec Králové, Česká republika

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

29/412/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Diclofenac Dr. Müller Pharma se u dospělých používá k úlevě od bolesti a zmírnění zánětu a otoku při akutním poranění šlach, vazů, kloubů a svalů způsobených např. podvrtnutím, natažením a pohmožděním. U dospívajících od 14 let ke krátkodobé místní úlevě od bolesti při akutním natažení, podvrtnutí nebo pohmoždění po tupém poranění.

Nanášejte gel lokálně na kůži postiženého místa 3 až 4krát denně a jemně vtírejte. Potřebné množství gelu odpovídá velikosti třešně až vlašského ořechu dle rozsahu léčeného místa.

Tento léčivý přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU**17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – 2D ČÁROVÝ KÓD****18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR – DATA ČITELNÁ OKEM**